HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
FARMACIA

Información de Medicamentos

BIKTARVY 50/200/25 mg

Bictegravir/Emtricitabina/Tenofovir alafenamida

Oral

Acciones: Medicamento utilizado para la infección producida por el virus de la inmunodeficiencia humana.

Consideraciones: Tome este medicamento CON o SIN alimentos.

Tome UN comprimido entero, sin partir ni masticar, tragándolo con ayuda de un vaso de agua.

Siga estrictamente la pauta indicada por su médico en cuanto a dosis y frecuencia de administración.

Si olvida una dosis y se da cuenta antes de las 18 horas posteriores a la hora a la que normalmente toma BIKTARVY, tiene que tomar el comprimido tan pronto como sea posible. Luego tome la dosis siguiente de la forma habitual. Si se da cuenta 18 horas o más después de la hora a la que normalmente toma BIKTARVY, no tome la dosis olvidada. Espere y tome la siguiente dosis, con alimentos, a la hora habitual.

Si vomita antes de que haya pasado una hora tras tomar BIKTARVY, debe repetir la dosis. Si vomita transcurrida 1 hora de haber tomado Biktarvy, no necesita tomar otro comprimido hasta el momento de la hora habitual.

Este medicamento no cura de la infección por VIH, pero retarda la progresión de la enfermedad, por eso, aunque se encuentre mejor, no deje de tomarlo.

No tome **RIFAMPICINA, HIERBA de SAN JUAN o HIPÉRICO** (Hypericum perforatum) durante el tratamiento.

BIKTARVY modifica la acción de otros fármacos, no tome otros medicamentos sin consultar antes a su médico o farmacéutico.

Consulte a su médico antes de tomar BIKTARVY en combinación con alguno de los siguientes medicamentos dado que ellos pueden afectar a la forma en la que BIKTARVY u otros medicamentos actúan:

- carbamazepina, oxcarbazepina, fenobarbital y fenitoína.
- azitromicina, claritromicina o rifabutina.
- ciclosporina, sucralfato.
- **antiácidos** (hidróxido de alumnio y/o magnesio), suplementos de minerales o vitaminas que contengan **magnesio o hierro**.

  Si está tomando alguno de estos medicamentos tendrá que tomar Biktarvy al menos 2 horas antes de tomar antiácidos o suplementos o 2 horas después junto con alimentos.

Informe inmediatamente a su médico si está embarazada o cree que puede estarlo, así como si quedase embarazada durante el tratamiento.

Avise a su médico si tiene algún hijo al que esté dándole el pecho.

Efectos adversos: Pueden aparecer efectos adversos tales como depresión, alteraciones del sueño, cefalea, diarrea, náuseas y cansancio (fatiga).

Estos consejos no sustituyen a la información del prospecto del medicamento.