POSOLOGÍA

MAVENCLAD® se administra por vía oral.

Está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con esclerosis múltiple.
recurrente. El tratamiento consta de 2 años.

Cada curso de tratamiento consiste en dos semanas de tratamiento, una al inicio del primer mes y otra al inicio del segundo mes del año de tratamiento respectivo.

La dosis depende del peso del paciente y se distribuye en 10 O 20mg durante 4 o 5 días.

¿CÓMO se debe TOMAR Mavenclad®?

Tome los comprimidos por vía oral con un vaso de agua, a la misma hora todos los días y **con o sin alimentos**. Si olvidó tomar una dosis consulte a su médico o farmacéutico.

¿Cuándo NO debe tomar Mavenclad®?

- Si es alérgico al principio activo o a alguno de los excipientes.
- Si tiene infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
- Infección crónica activa (tuberculosis o hepatitis).
- Si esta inmunocomprometido, o recibe actualmente tratamiento inmunosupresor.
- Si tiene neoplasia maligna activa.
- Si tiene insuficiencia renal moderada o grave.
- Si está embarazada o en periodo de lactancia

PRECAUCIONES:

- **Tanto hombres como mujeres deben de usar métodos anticonceptivos** efectivos durante el tratamiento con cladribina y por lo menos hasta seis meses después de la última dosis.
- No se recomienda el uso de MAVENCLAD en los pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave (puntuación de Child-Pugh > 6)
- No utilizar vacunas vivas o vivas atenuadas.

IMPORTANTE SABER QUE:

Se recomienda que la administración de **cualquier otro medicamento por vía oral se separe de la de MAVENCLAD por lo menos tres horas** durante el número limitado de días de administración de cladribina.

INTERACCIONES:

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma:

- Antibióticos: rifampicina.
- Antiepilépticos: carbamazepina
- Nifedipino, nimodipino, reserpina, cilostazol (usados para tratar enfermedades del corazón, la hipertensión, enfermedades vasculares) o eltrombopag (usado para tratar enfermedades asociadas a hemorragias).
- Hierba de San Juan.
- Corticoides.

EFECTOS ADVERSOS:

Los efectos adversos más frecuentes que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son:

- Disminución del número de glóbulos blancos (neutropenia) aumentando la incidencia de infecciones (frecuente infección por Herpes). Controlar aparición de fiebre.
- Caída del cabello
- Erupción cutánea

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

Avise rápidamente a su médico si tiene:

Una reacción alérgica grave: enrojecimiento de la piel, dificultad para respirar…

CONSERVACIÓN

Mantenga los comprimidos en su envase original a temperatura ambiente, protegidas de la luz y de la humedad.

CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Lávese muy bien las manos después de manipular los comprimidos.

Este medicamento se dispensa en el Servicio de Farmacia del Hospital.

Si le cambian el tratamiento, devuelva la medicación sobrante a la farmacia del Hospital.

RECOMENDACIONES AL PACIENTE

NOTAS:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento.

Si tiene cualquier duda o precisa más información, contacte con su médico o farmacéutico

¿CÓMO CONTACTAR?

Teléfono para solicitar cita: 876764239 (9:00 a 11:00)
Teléfono Farmacia para dudas o consultas: 976769569
farmaciapexternos@salud.aragon.es
Horario: Lunes a Viernes 9:00 – 15:00 h. Martes y Jueves de 15:30 a 19:00h con cita previa

Hospital Universitario Miguel Servet

Fecha revisión:

01/2024

INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

Cladribina

MAVENCLAD®

Comprimidos

Nombre del paciente:

Fecha: