HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET FARMACIA

Información de Medicamentos

DOVATO 50 MG/300 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Dolutegravir/Lamivudina

Oral

Acciones: Medicamento utilizado para la infección producida por el virus de la inmunodeficiencia humana.

Consideraciones: Tome este medicamento CON o SIN alimentos.

Tome UN comprimido entero, sin partir ni masticar, tragándolo con ayuda de un vaso de agua.

Siga estrictamente la pauta indicada por su médico en cuanto a dosis y frecuencia de administración.

Si olvida una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde. Pero si quedan menos de 4 horas para su próxima dosis, sáltese esa dosis que olvidó y tome la siguiente a la hora habitual. Luego continúe su tratamiento como antes.

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Este medicamento no cura de la infección por VIH, pero retarda la progresión de la enfermedad, por eso, aunque se encuentre mejor, no deje de tomarlo.

Algunos medicamentos pueden afectar al funcionamiento de Dovato o aumentar la probabilidad de sufrir efectos adversos. Dovato también puede afectar al funcionamiento de algunos otros medicamentos. Informe a su médico si está tomando alguno de los siguientes medicamentos:

- Metformina
- Antiácidos. No tome un antiácido durante las 6 horas antes de tomar Dovato, o por lo menos 2 horas después de tomarlo.
- Suplementos o multivitamínicos que contienen calcio, hierro o magnesio. Si toma Dovato con comida, puede tomar los suplementos o multivitamínicos que contengan calcio, hierro o magnesio a la vez que Dovato. Si no toma Dovato con comida, no puede tomar un suplemento o multivitamínico durante las 6 horas antes o 2 horas después de tomar Dovato.
- Medicamentos que contengan sorbitol y otros polialcoholes (como xilitol, manitol, lactitol o maltitol), si se toman con regularidad
- Rifampicina.
- Fenitoína y fenobarbital.
- Oxcarbazepina y carbamazepina.
- Hierba de San Juan (*Hypericum perforatum*).

Embarazo: informe inmediatamente a su médico si está embarazada o cree que puede estarlo, así como si quedase embarazada durante el tratamiento.

Durante el tratamiento con Dovato debe utilizar un método anticonceptivo de barrera (por ejemplo, un preservativo) junto con otros métodos anticonceptivos, como los anticonceptivos orales (la píldora) u otros anticonceptivos hormonales (por ejemplo, implantes o inyecciones) para evitar el embarazo.

Avise a su médico si tiene algún hijo al que esté dándole el pecho.

Efectos adversos: Pueden aparecer efectos adversos tales como cefalea (dolor de cabeza), diarrea, naúseas, dolor abdominal, flatulencia, alteraciones del sueño como insomnio o pesadillas, erupción cutánea, dolor articular y/o muscular, pérdida de cabello.