POSOLOGÍA

Dimetilfumarato se administra por vía oral.
Está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con esclerosis múltiple remitente-recurrente.
Habitualmente se inicia el tratamiento de forma escalonada:

- 1ª y 2ª semana: 120 mg cada 12h
- 3ª semana: 120 mg por la mañana y 240 mg por la noche
- 4º semana en adelante: 240 mg cada 12h

La dosis de mantenimiento son 240 mg cada 12h

¿CÓMO se debe TOMAR Dimetilfumarato?

Se debe tomar **con alimentos**.
Tome las cápsulas por vía oral con un vaso de agua, se deben tragar intactas, sin abrirlas, **a la misma hora todos los días**.

¿QUÉ hacer si...?

Si se le ha olvidado tomar una dosis puede tomar la dosis olvidada únicamente si deja pasar 4 horas entre dosis. Si no es así, debe esperar hasta la siguiente dosis programada a la hora habitual.

Nunca tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

¿Cuándo NO debe tomar Dimetilfumarato?

- Si tiene alergia al principio activo o a alguno de los excipientes.
- Ante sospecha o confirmación de Leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP)
- Si tiene recuento de glóbulos blancos muy bajo y durante un tiempo prolongado.
- Embarazo o lactancia

PRECAUCIONES:

- En insuficiencia renal o hepática grave (monitorización estrecha por el médico responsable)
- Si está en tratamiento con inmunosupresores
- Si tiene enfermedad gastrointestinal activa
- No deben administrarse vacunas vivas atenuadas

INTERACCIONES

- Antineoplásicos, inmunomoduladores, inmunosupresores
- Medicamentos que afectan a los riñones (aminoglucósidos, diuréticos, AINEs, litio)

EFECTOS ADVERSOS:

Los efectos adversos más frecuentes, que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son:

- Gastroenteritis
- Disminución del recuento de glóbulos rojos y blancos
- Sensación de quemazón
- **Rubefacción**
- Sofocos
- Prurito, exantema, eritema, alopecia
- **Trastornos gastrointestinales: Náuseas y vómitos, diarrea, dolor abdominal, dispepsia, gastritis**
- Aumento de enzimas hepáticas
- Albumina y cetonas en orina

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos estos efectos adversos o cualquier otro que crea que pueda estar relacionado.

Avise rápidamente a su médico si tiene:

- Si presentan signos de alergia grave
- Si presenta rubefacción intensa
- Si presenta una infección grave
- Si presenta signos o síntomas de infección por Herpes Zoster

CONSERVACIÓN

Mantenga los comprimidos en su envase original a temperatura ambiente, protegidas de la luz y de la humedad.

CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Lávese muy bien las manos después de manipular los comprimidos.

Este medicamento se dispensa en el Servicio de Farmacia del Hospital.

Si le cambian el tratamiento, devuelva la medicación sobrante a la farmacia del Hospital.

RECOMENDACIONES AL PACIENTE

NOTAS:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento.

Si tiene cualquier duda o precisa más información, contacte con su médico o farmacéutico

¿CÓMO CONTACTAR?

Teléfono para solicitar cita: 876764239 (9:00 a 11:00)
Teléfono Farmacia para consultas o dudas: 976769569
farmaciapexternos@salud.aragon.es
Horario: Lunes a Viernes 9:00 – 15:00 h. Martes y Jueves de 15:30 a 19:00h con cita previa

Hospital Universitario Miguel Servet

Fecha revisión:

01/2024

INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

Dimetilfumarato

Comprimidos

Nombre del paciente:

Fecha: