

## ¿Qué es?

Dupixent® Dupilumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que se utiliza para tratar el asma grave no controlada que no se controla con su medicación actual. También para la dermatitis atópica moderada-grave.

## ¿CÓMO se debe ADMINISTRAR Dupixent®?

- La dosis habitual para pacientes adultos es una dosis inicial de 600 mg (dos inyecciones de 300 mg), seguida de 300 mg cada dos semanas administrados mediante inyección subcutánea.

- En niños y adolescentes el médico ajustará la dosis en función del peso del paciente.

- Existen presentaciones en jeringas y plumas precargadas.

- La inyección se puede administrar en el abdomen, muslos o en la zona externa de la parte superior de los brazos (el brazo sólo se debe utilizar si la inyección la aplica otra persona que no sea el paciente).

- Se deben alternar los lugares de inyección y las inyecciones no se deben administrar en zonas donde la piel sea sensible, esté dañada, enrojecida o endurecida.

## ¿Cuándo NO debe administrarse Dupixent®?

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

## ¿Qué hago si OLVIDO UNA DOSIS?:

Si ha olvidado inyectarse una dosis de Dupixent®, hable con su médico o farmacéutico tan pronto como le sea posible, que le indicarán como proceder.

## INTERACCIONES

**Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. En principio no hay descritas interacciones con otros medicamentos.**

## PRECAUCIONES

- Si es alérgico a dupilumab o alguno de sus excipientes
- Infecciones por parásitos (helmintos)
- Embarazo y lactancia

## EFFECTOS ADVERSOS:

Los efectos adversos descritos más frecuentes, no significa que aparezcan en todos los pacientes, son:

- Dolor, picor, hinchazón en el lugar de la inyección
- Conjuntivitis, artralgia, herpes oral.

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

## Avise rápidamente a su médico:

- Si cree que puede estar teniendo una reacción alérgica. Pueden suceder al cabo de horas o días después de la inyección.
- Los síntomas habituales incluyen: hinchazón en la cara, lengua problemas de respiración, desmayo, mareo, aturdimiento, dificultad para respirar, enrojecimiento de la piel.

## CONSERVACIÓN

En nevera (entre 2°C y 8°C). No congelar. Debe conservar la solución inyectable en el envase original para protegerla de la luz.

## CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

## ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Este medicamento se puede conseguir a través del Servicio de Farmacia del Hospital.

Devuelva la medicación sobrante a la farmacia del Hospital.

## RECOMENDACIONES AL PACIENTE

NOTAS:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento.

Si tiene cualquier duda o precisa más información, contacte con su médico o farmacéutico

## ¿CÓMO CONTACTAR?

Teléfono para solicitar cita: 876764239 (9:00 a 11:00)

Teléfono Farmacia para dudas o consultas: 976769569

[farmaciapexternos@salud.aragon.es](mailto:farmaciapexternos@salud.aragon.es)

Horario: Lunes a Viernes 9:00 – 15:00 h. Martes y Jueves de 15:30 a 19:00h con cita previa

Hospital Universitario  
Miguel Servet

Fecha revisión:

01/2024

# INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS



## DUPILUMAB

## DUPIXENT®

### Plumas precargadas

Nombre del paciente:

Fecha: