POSOLOGÍA

AIMOVIG® Erenumab es un anticuerpo monoclonal humano, utilizado para profilaxis de migraña.

¿CÓMO se debe ADMINISTRAR AIMOVIG ®?

Se deberá administrar 1 inyección subcutánea cada 4 semanas.

La inyección se puede administrar en el abdomen, muslos o en la zona externa de la parte superior de los brazos (el brazo sólo se debe utilizar si la inyección la aplica otra persona que no sea el paciente).

Se deben alternar los lugares de inyección y las inyecciones no se deben administrar en zonas donde la piel sea sensible, esté dañada, enrojecida o endurecida.

Para evitar molestias en el lugar de inyección, mantener la pluma a temperatura ambiente durante al menos 30 minutos antes de la inyección.

¿Cuándo NO debe administrarse AIMOVIG®?

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

¿Qué hago si OLVIDO UNA DOSIS?:

Si olvidó una dosis de ENENUMAB (AIMOVIG®), debe administrarla lo antes posible tras darse cuenta de ello.
Después póngase en contacto con su médico, quien le dirá cuándo se debe administrar la dosis siguiente.

INTERACCIONES

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. En principio no hay descritas interacciones con otros medicamentos.

PRECAUCIONES

- ❑ Si es alérgico a erenumab o alguno de sus excipientes (sacarosa)
- ❑ Embarazo y lactancia

EFECTOS ADVERSOS:

Los efectos adversos más frecuentes (1 de cada 10 personas), no significa que aparezcan en todos los pacientes, son:

- Estreñimiento
- Picor
- Reacciones alérgicas tales como erupción, hinchazón o urticaria.
- Espasmos musculares
- Reacciones en el lugar de la inyección, tales como dolor, enrojecimiento e hinchazón en el lugar donde se administra la inyección.

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

Avise rápidamente a su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave: enrojecimiento de la piel, dificultad para respirar…

salud
servicio aragonés de salud

CONSERVACIÓN

En nevera (entre 2°C y 8°C). No congelar. Debe conservar la pluma precargada en el envase original para protegerla de la luz.

CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Este medicamento se puede conseguir a través del Servicio de Farmacia del Hospital.

Devuelva la medicación sobrante a la farmacia del Hospital.

RECOMENDACIONES AL PACIENTE

NOTAS:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento.

Si tiene cualquier duda o precisa más información, contacte con su médico o farmacéutico

¿CÓMO CONTACTAR?

Teléfono para solicitar cita: 876764239 (9:00 a 11:00)
Teléfono Farmacia para dudas o consultas: 976769569
farmaciapexternos@salud.aragon.es
Horario: Lunes a Viernes 9:00 – 15:00 h. Martes y Jueves de 15:30 a 19:00h con cita previa

Hospital Universitario Miguel Servet

Fecha revisión:

01/2024

INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

Erenumab

AIMOVIG®

Plumas precargadas

Nombre del paciente:

Fecha: