HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
FARMACIA

Información de Medicamentos

EVIPLERA 200/25mg/245mg

Emtricitabina/Rilpivirina/Tenofovir disoproxil

Oral

Acciones: Medicamento utilizado para la infección producida por el virus de la inmunodeficiencia humana.

Consideraciones: EVIPLERA **se debe tomar con una comida de al menos 400 kcal**. Es importante tomarlo con comida para alcanzar las concentraciones correctas del principio activo en su cuerpo. Una bebida nutricional (aunque sea rica en proteínas) por sí sola no sustituye a una comida.

Tome los comprimidos enteros, sin partir ni masticar, tragándolos con ayuda de un vaso de agua.

Siga estrictamente la pauta indicada por su médico en cuanto a dosis y frecuencia de administración. Si se da cuenta en las 12 horas siguientes a la hora habitual de la toma de EVIPLERA, tome el comprimido lo antes posible. Después tome la dosis siguiente como de costumbre. Si se da cuenta después de 12 horas, no tome esa dosis y continúe con las siguientes de la forma acostumbrada.

Si tiene o ha tenido problemas con sus riñones, dígaselo a su médico

Este medicamento no cura de la infección por VIH, pero retarda la progresión de la enfermedad, por eso, aunque se encuentre mejor, no deje de tomarlo.

EVIPLERA modifica la acción de otros fármacos, no tome otros medicamentos sin consultar antes a su médico o farmacéutico. No tome EVIPLERA en combinación con ninguno de los siguientes medicamentos dado que ellos pueden afectar a la forma en la que EVIPLERA u otros medicamentos actúan:

- carbamazepina, oxcarbazepina, fenobarbital y fenitoína
- rifampicina, rifapentina
- **omeprazol**, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol
- dexametasona
- productos que contienen Hierba de San Juan o Hipérico (Hypericum perforatum).

Informe inmediatamente a su médico si está embarazada o cree que puede estarlo, así como si quedase embarazada durante el tratamiento.

Avise a su médico si tiene algún hijo al que esté dándole el pecho.

Efectos adversos: Pueden aparecer efectos adversos como aumento en el colesterol y/o amilasa pancreática en su sangre, alteraciones en una de las pruebas hepáticas habituales (transaminasas), dificultad para conciliar el sueño (insomnio), dolor de cabeza, mareo, náuseas, vómitos, diarrea o debilidad.

Estos consejos no sustituyen a la información del prospecto del medicamento.