HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
FARMACIA

Información de Medicamentos

JULUCA 50/25 mg

Dolutegravir/Ripivirina

Oral

Acciones: Medicamento utilizado para la infección producida por el virus de la inmunodeficiencia humana.

Consideraciones: Tome este medicamento CON alimentos.

Tome UN comprimido entero, sin partir ni masticar, tragándolo con ayuda de un vaso de agua.

Siga estrictamente la pauta indicada por su médico en cuanto a dosis y frecuencia de administración.

Si olvida una dosis y se da cuenta antes de las 12 horas posteriores a la hora a la que normalmente toma JULUCA, tiene que tomar el comprimido tan pronto como sea posible junto con una comida. Luego tome la siguiente dosis de la forma habitual. Si han pasado 12 horas o más no tome la dosis olvidada, espere y tome la siguiente dosis a la hora habitual.

Si vomita antes de que hayan pasado 4 horas tras tomar JULUCA, debe repetir la dosis con una comida. Si vomita transcurridas 4 horas de haber tomado JULUCA, no necesita tomar otro comprimido.

Este medicamento no cura de la infección por VIH, pero retarda la progresión de la enfermedad, por eso, aunque se encuentre mejor, no deje de tomarlo. Mientras esté tomando este medicamento aún puede transmitir el VIH a los demás, aunque el tratamiento antirretroviral eficaz reduzca el riesgo.

JULUCA modifica la acción de otros fármacos, no tome otros medicamentos sin consultar antes a su médico o farmacéutico. Se recomienda no tomar JULUCA en combinación con ninguno de los siguientes medicamentos:

- Carbamazepina, oxcarbazepina, fenobarbital, fenitoína
- Rifampicina, rifapentina, rifabutina
- Inhibidores de la bomba de protones, como omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol
- Dexametasona sistémica, excepto en tratamiento de dosis única
- Productos que contienen Hierba de San Juan o Hipérico (*Hypericum perforatum*)

Consulte a su médico antes de tomar JULUCA en combinación con alguno de los siguientes medicamentos dado que ellos pueden afectar a la forma en la que JULUCA u otros medicamentos actúan:

- **antagonistas de receptores H_2 (ranitidina, famotidina)**. Si está tomando estos medicamentos se recomienda que se administren 12 horas antes o 4 horas después de administrar JULUCA.
- **antiácidos (hidróxido de aluminio y/o magnesio).** Si está tomando estos medicamentos se recomienda que estos medicamentos se administren 6 horas antes o 4 horas después de administrar JULUCA.
- **suplementos de calcio o hierro, o multivitaminas** se deben administrar al mismo tiempo que JULUCA, con una comida. En el caso en que no se pudieran tomar al mismo tiempo que JULUCA, se recomienda administrar estos suplementos 6 horas antes o 4 horas después de tomar JULUCA.

Embarazo: informe inmediatamente a su médico si está embarazada o cree que puede estarlo, así como si quedase embarazada durante el tratamiento. Durante el tratamiento con Dovato debe utilizar un método anticonceptivo de barrera (por ejemplo, un preservativo) junto con otros métodos anticonceptivos, como los anticonceptivos orales (la píldora) u otros anticonceptivos hormonales (por ejemplo, implantes o inyecciones) para evitar el embarazo.

Efectos adversos: Pueden aparecer efectos adversos tales como cefalea (dolor de cabeza), mareos, diarrea, náuseas y alteraciones del sueño como insomnio o pesadillas.