

## ¿Qué es?

XOLAIR® Omalizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado se utiliza para prevenir que el asma empeore controlando los síntomas del asma alérgica grave.

## ¿CÓMO se debe ADMINISTRAR XOLAIR®?

Necesitará entre 1 y 4 inyecciones al mismo tiempo que se pueden administrar cada dos o cada cuatro semanas. Ello dependerá de sus niveles de IgE en sangre y su peso corporal.

La inyección subcutánea se puede administrar en el abdomen, muslos o en la zona externa de la parte superior de los brazos (el brazo sólo se debe utilizar si la inyección la aplica otra persona que no sea el paciente).

Se deben alternar los lugares de inyección y las inyecciones no se deben administrar en zonas donde la piel sea sensible, esté dañada, enrojecida o endurecida.

## ¿Cuándo NO debe administrarse XOLAIR®?

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

## ¿Qué hago si OLVIDO UNA DOSIS?:

Si olvidó una dosis de Omalizumab (XOLAIR®), debe administrarla lo antes posible tras darse cuenta de ello.

Después póngase en contacto con su médico, quien le dirá cuándo se debe administrar la dosis siguiente.

## INTERACCIONES

**Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. En principio no hay descritas interacciones con otros medicamentos.**

## PRECAUCIONES

- Si es alérgico a omalizumab o alguno de sus excipientes, incluido el látex.
- En problemas de riñón o hígado
- Infecciones por parásitos (helmintos)
- Embarazo y lactancia

## EFFECTOS ADVERSOS:

Los efectos adversos descritos más frecuentes, que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son:

- Cefalea, dolor en el lugar de la inyección
- Fiebre (en niños)
- Dolor en las articulaciones

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

## Avise rápidamente a su médico si tiene:

- Si cree que puede estar teniendo una reacción alérgica. Pueden suceder al cabo de horas o días después de la inyección.
- Los síntomas habituales incluyen: hinchazón en la cara, lengua problemas de respiración, desmayo, mareo, aturdimiento, dificultad para respirar, enrojecimiento de la piel.

## CONSERVACIÓN

En nevera (entre 2°C y 8°C). No congelar. Debe conservar la solución inyectable en el envase original para protegerla de la luz.

## CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

## ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Este medicamento se puede conseguir a través del Servicio de Farmacia del Hospital.

Devuelva la medicación sobrante a la farmacia del Hospital.

## RECOMENDACIONES AL PACIENTE

NOTAS:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento.

Si tiene cualquier duda o precisa más información, contacte con su médico o farmacéutico

## ¿CÓMO CONTACTAR?

Teléfono para solicitar cita: 876764239 (9:00 a 11:00)

Teléfono Farmacia para dudas o consultas: 976769569

[farmaciapexternos@salud.aragon.es](mailto:farmaciapexternos@salud.aragon.es)

Horario: Lunes a Viernes 9:00 – 15:00 h. Martes y Jueves de 15:30 a 19:00h con cita previa

Hospital Universitario  
Miguel Servet

Fecha revisión:

01/2024

## INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS



## OMALIZUMAB

# XOLAIR®

### Jeringas precargadas

Nombre del paciente:

Fecha: