¿QUÉ ES OZANIMOD (ZEPOSIA®)?

Zeposia® está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con esclerosis múltiple remitente-recurrente (EMRR) con enfermedad activa y pacientes con colitis ulcerosa.

POSOLOGÍA

 Se requiere una pauta posológica inicial de aumento escalonado de la dosis de ozanimod desde el día 1 hasta el día 7:

Día 1-4	0,23 mg una vez al día
Día 5-7	0,46 mg una vez al día
Días 8 y posteriores	0,92 mg una vez al día

- No interrumpir el tratamiento durante el escalado de dosis (primeros 14 días), de lo contrario debería empezar con el escalado de dosis de nuevo.
- Si interrumpe el tratamiento consulte con su médico o farmacéutico
- Las cápsulas se pueden tomar con o sin alimentos.

¿QUÉ hacer si...?

- Si se salta una dosis de Zeposia®, tómela lo antes posible. Tómese la siguiente dosis a su hora habitual.
- Si se olvida la dosis durante un día entero, sáltese la dosis olvidada y tome la siguiente dosis a la hora habitual.
- No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

PRECAUCIONES:

- Si ha tenido problemas cardiacos como un ataque al corazón, una angina de pecho o un ictus coménteselo a su médico.
- Problemas hepáticos graves.
- Infecciones previas por tuberculosis.
- Tumores
- Las mujeres con capacidad de gestación deben utilizar métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento con Zeposia® y durante 3 meses tras la suspensión del tratamiento.
- Evite las vacunas vivas atenuadas durante el tratamiento y hasta 3 meses después de haberlo suspendido.
- Debe protegerse de la exposición al sol y los rayos UV.
- Antecedentes de neoplásias

INTERACCIONES

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma:

- Rifampicina
- Gemfibrozilo
- Clopidogrel
- Fenelzina, selegilina
- Betabloqueantes, antagonistas calcio
- Azatioprina y 6-mercaptopurina
- Ciclosporina
- Vacunas vivas atenuadas

¿Cuándo NO debe tomar ZEPOSIA®?

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.
- Si está embarazada o cree que pudiera estarlo.
- No debe dar el pecho mientras esté tomando Zeposia.

EFECTOS ADVERSOS:

Los efectos adversos más frecuentes, que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son:

- Disminución de linfocitos.
- Infecciones del tracto respiratorio superior tales como resfriado, moqueo, infección de los senos paranasales (sinusitis), nasofaringitis.
- Dolor de cabeza.
- Hipertensión
- Erupción y urticaria.
- Alteraciones visuales.
- Disminución del ritmo cardíaco (bradicardia).
- Elevación de enzimas hepáticas.

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

Avise rápidamente a su médico si tiene:

- Si tiene alguna infección.
- Coloración amarillenta de la piel o el blanco de los ojos.
- Orina de color oscuro (amarronado).
- Dolor en el lado derecho del abdomen.
- Si presenta síntomas de inicio repentino como dolor de cabeza intenso, confusión, convulsiones y cambios de visión.
- Si tiene síntomas como dolor de cabeza, rigidez de la nuca, sensibilidad a la luz, nauseas o confusión.



CONSERVACIÓN

No conservar a temperatura superior de 25°C.

CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase (último día del mes).

ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Este medicamento se adquiere a través del Servicio de Farmacia del Hospital.

Devuelva la medicación sobrante a la farmacia del Hospital.

RECOMENDACIONES AL PACIENTE

NOTAS:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento.

Si tiene cualquier duda o precisa más información, contacte con su médico o farmacéutico

¿CÓMO CONTACTAR?

Teléfono para solicitar cita: 876764239 (9:00 a 11:00) Teléfono Farmacia para consultas o dudas: 976769569 farmaciapexternos@salud.aragon.es

Horario: Lunes a Viernes 9:00 – 15:00 h. Martes y Jueves de 15:30 a 19:00h con cita previa

Hospital Universitario
Miguel Servet

Fecha revisión:

01/2024

INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS



OZANIMOD

ZEPOSIA®

Cápsulas

Nombre del paciente:

Fecha: