## POSOLOGÍA

PONVORY® se administra por vía oral.

Requiere de un aumento progresivo de la dosis durante 14 días hasta alcanzar la de mantenimiento.

| Día de ajuste de la dosis | Dosis diaria |
|---|---|
| Día 1 y 2 | 2 mg |
| Día 3 y 4 | 3 mg |
| Día 5 y 6 | 4 mg |
| Día 7 | 5 mg |
| Día 8 | 6 mg |
| Día 9 | 7 mg |
| Día 10 | 8 mg |
| Día 11 | 9 mg |
| Día 12, 13 y 14 | 10 mg |

-Dosis de mantenimiento: 20 mg al día.

## ¿CÓMO se debe TOMAR Ponvory®?

Tome los comprimidos por vía oral con un vaso de agua, a la misma hora todos los días **con o sin alimentos**.

- Si se omiten **menos de 4 dosis** consecutivas, reanudar el tratamiento con la primera dosis omitida.
- Si se omiten **4 o más dosis** consecutivas, reiniciar el tratamiento con la dosis del día 1 (nuevo envase de inicio del tratamiento).

## ¿Cuándo NO debe tomar Ponvory®?

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.
- Síndrome de inmunodeficiencia.
- Problemas cardiovasculares en los 6 meses previos.
- Insuficiencia hepática moderada o grave.
- Neoplasias activas
- Infecciones activas
- Antecedentes de bloqueo cardiaco
- Embarazo y lactancia

## PRECAUCIONES:

- Debe utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y al menos 1 semana después de la última dosis.
- Si nunca ha pasado la varicela y no está vacunado
- Si alguna vez ha tenido o tiene problemas de visión (puede provocar edema macular cuyo riesgo es mayor si es diabético)
- Si tiene problemas cardiovasculares
- Si tiene presión arterial alta debe controlarla
- Evite las vacunas vivas atenuadas durante el tratamiento y hasta 1 semanas después de haberlo suspendido
- Debe protegerse de la exposición al sol y los rayos UV

## INTERACCIONES:

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma:

- Antineoplásicos, inumosupresores
- Antiarrítmicos: amiodarona, sotalol, quinidina, procainamida
- Fármacos que disminuyen la frecuencia cardiaca: diltiazem, verapamilo, digoxina, ivabradina
- betabloqueantes: atenolol, propanolol
- Fluconazol
- Carbamazepina
- Modafinilo

## EFECTOS ADVERSOS:

Los efectos adversos más frecuentes que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son:

-**Dolor de cabeza**, mareos
-Nauseas, diarrea
-**Hipertensión**
-Puede disminuir el número de glóbulos blancos (neutropenia) aumentando la incidencia de infecciones. Controlar aparición de fiebre, dolor de garganta y/o úlcera en la boca.
-Depresión, insomnio, ansiedad
-Alteraciones visuales
-Latidos del corazón irregulares o lentos
-**Alteraciones de las enzimas hepáticas**

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

**Avise rápidamente a su médico si tiene:**

- Si tiene alguna infección.
- Coloración amarillenta de la piel o el blanco de los ojos.
- Orina de color oscuro (amarronado).
- Dolor en el lado derecho del abdomen.
- Si presenta síntomas de inicio repentino como dolor de cabeza intenso, confusión, convulsiones y cambios de visión.
- Si tiene síntomas como dolor de cabeza, rigidez de la nuca, sensibilidad a la luz, nauseas o confusión.

salud
servicio aragonés de salud

## CONSERVACIÓN

Mantenga los comprimidos en su envase original a temperatura ambiente, protegidas de la luz y de la humedad.

## CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

## ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Lávese muy bien las manos después de manipular los comprimidos.

Este medicamento se dispensa en el Servicio de Farmacia del Hospital.

Si le cambian el tratamiento, devuelva la medicación sobrante a la farmacia del Hospital.

## RECOMENDACIONES AL PACIENTE

NOTAS:
Lactosa

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento.

Si tiene cualquier duda o precisa más información, contacte con su médico o farmacéutico

## ¿CÓMO CONTACTAR?

Teléfono para solicitar cita o encargar medicamentos: 876764239 (9:00 a 11:00)
Para consultas o dudas sobre su tratamiento: 976769569
farmaciapexternos@salud.aragon.es
Horario: Lunes a Viernes 9:00 – 15:00 h. Martes y Jueves de 15:30 a 19:00h con cita previa

Hospital Universitario Miguel Servet

Fecha revisión:

01/2024

# INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

# Ponesimod

# PONVORY®

## Comprimidos

Nombre del paciente:

Fecha: