POSOLOGÍA

MAYZENT® se administra por vía oral.

Está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con esclerosis múltiple secundaria progresiva. Requiere de un aumento progresivo de la dosis hasta alcanzar la de mantenimiento.

-Dosis de inicio (5 días): 0,25 días 1 y 2, 0,5 mg día 3, 0,75 mg día 4 y 1,25 mg día 5.

-Dosis de mantenimiento: 1 mg o 2 mg al día en función de su metabolismo del fármaco.

¿CÓMO se debe TOMAR Mayzent®?

Tome los comprimidos por vía oral con un vaso de agua, a la misma hora todos los días, y **con o sin alimentos.**

Si olvida una dosis en los 6 primeros días debe volver al día 1 de la dosis de inicio (0,25mg). Si la dosis olvidada es después de los 6 días, debe tomársela al día siguiente. Si olvida 4 dosis o más seguidas consulte con su médico o farmacéutico.

¿Cuándo NO debe tomar Mayzent®?

- Hipersensibilidad al principio activo, cacahuete, soja o a alguno de los excipientes.
- Síndrome de inmunodeficiencia
- Antecedentes de leucoencefalopatía multifocal progresiva o meningitis criptocócica
- Procesos cancerígenos activos
- Insuficiencia hepática grave
- Problemas cardiovasculares en los 6 meses previos
- Antecedentes de bloqueo cardiaco
- Embarazo y lactancia

PRECAUCIONES:

- Debe utilizar dos métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento y 10 días después de la última dosis.
- Si nunca ha pasado la varicela y no está vacunado
- Si alguna vez ha tenido o tiene problemas de visión (puede provocar edema macular cuyo riesgo es mayor si es diabético)
- Si tiene problemas cardiovasculares
- Si tiene presión arterial alta debe controlarla
- Evite las vacunas vivas atenuadas durante el tratamiento y hasta 4 semanas después de haberlo suspendido
- Debe protegerse de la exposición al sol y los rayos UV

INTERACCIONES:

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma:

- Antineoplásicos, inumosupresores
- Antiarrítmicos: amiodarona, sotalol, quinidina, procainamida
- Fármacos que disminuyen la frecuencia cardiaca: diltiazem, verapamilo, digoxina, ivabradina
- betabloqueantes: atenolol, propanolol
- Fluconazol
- Carbamazepina
- Modafinilo

EFECTOS ADVERSOS:

Los efectos adversos más frecuentes que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son:

-**Dolor de cabeza**, mareos

-Nauseas, diarrea

-**Hipertensión**

-Puede disminuir el número de glóbulos blancos (neutropenia) aumentando la incidencia de infecciones. Controlar aparición de fiebre, dolor de garganta y/o úlcera en la boca.

-Infección por Herpes Zoster

-Alteraciones visuales

-Bradicardia

-**Alteraciones de las enzimas hepáticas**

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

Avise rápidamente a su médico si tiene:

- Si tiene alguna infección.
- Coloración amarillenta de la piel o el blanco de los ojos.
- Orina de color oscuro (amarronado).
- Dolor en el lado derecho del abdomen.
- Si presenta síntomas de inicio repentino como dolor de cabeza intenso, confusión, convulsiones y cambios de visión.
- Si tiene síntomas como dolor de cabeza, rigidez de la nuca, sensibilidad a la luz, nauseas o confusión.

CONSERVACIÓN

Mantenga los comprimidos en su envase original a temperatura ambiente, protegidas de la luz y de la humedad.

CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Lávese muy bien las manos después de manipular los comprimidos.

Este medicamento se dispensa en el Servicio de Farmacia del Hospital.

Si le cambian el tratamiento, devuelva la medicación sobrante a la farmacia del Hospital.

RECOMENDACIONES AL PACIENTE

NOTAS:
Lactosa

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento.

Si tiene cualquier duda o precisa más información, contacte con su médico o farmacéutico

¿CÓMO CONTACTAR?

Teléfono para solicitar cita: 876764239 (9:00 a 11:00)
Teléfono Farmacia: 976769569
farmaciapexternos@salud.aragon.es
Horario: Lunes a Viernes 9:00 – 15:00 h. Martes y Jueves de 15:30 a 19:00h con cita previa

Hospital Universitario Miguel Servet

Fecha revisión:

01/2024

INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

Siponimod

MAYZENT®

Comprimidos

Nombre del paciente:

Fecha: