EPCLUSA®comprimidos -Sofosbuvir + Velpatasvir-

¿Qué es?

Sofosbuvir + Velpatasvir (Epclusa®) es una combinación de dos medicamentos antivíricos utilizados en adultos, para tratar la hepatitis C crónica (de larga evolución).

¿CÓMO se debe TOMAR?

- **1 comprimido UNA vez al día CON o SIN ALIMENTOS.**
- Lávese las manos antes y después de cada toma.
- Deben tragarse enteros con un vaso de agua sin disolverlos, ni masticar, ni chupar.

¿Qué hacer si…?

- Si se ha olvidado de tomar una dosis, tómela lo antes posible y a continuación tome la siguiente dosis a su hora habitual. Si han transcurrido más de 18 horas espere a la siguiente toma.
- Si vomita en un plazo de 3 horas después de la toma de Epclusa®, debe tomar un comprimido adicional, si vomita en un periodo posterior a las 3 horas no debe tomar ninguna dosis adicional.
- **No tome una dosis doble** para compensar un olvido.

¿Cuándo NO debe tomar Epclusa®?

- Si usted es alérgico a sofosbuvir o velpatasvir.
- Si está embarazada o en período de lactancia.

¿Qué PRECAUCIONES deben tenerse?

- Si se queda embarazada debe informar inmediatamente a su médico.

¿Puede afectar la toma de otros medicamentos?

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma:

- Antibióticos rifampicina, rifabutina
- Antiepilépticos: fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, oxcarbamacepina, eslicarbazepina
- Antivirales: efavirenz.
- Estatinas
- Anticoagulantes orales
- Amiodarona
- Digoxina
- Hierba de San Juan (hipérico)
- Antiácidos:

  -Separación de 4 horas entre Epclusa® y antiácido (ej. hidróxido de aluminio, de magnesio,..)

  -Administración simultánea con ranitidina, famotidina,..

  -Evitar omeprazol, pantoprazol,.., en caso necesario, tomar Epclusa® con alimentos y 4 horas antes de estos antiácidos (máx. 20mg omeprazol/día)

¿Qué problemas pueden producirse con su empleo?

Los efectos adversos más frecuentes, que no significa que aparezcan en todos los pacientes son:

- Cansancio intenso, fatiga, sensación de debilidad o falta de energía.
- Cefalea
- Náuseas

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

Acuda a URGENCIAS si aparece..

Una reacción alérgica grave (enrojecimiento de la piel, dificultad para respirar,..)

En caso de sobredosis

RECUERDE, ES MUY IMPORTANTE QUE SIGA RIGUROSAMENTE EL TRATAMIENTO PARA GARANTIZAR UN BUEN CONTROL DE SU ENFERMEDAD

¿Cómo se conserva?

- Mantenga este medicamento a temperatura ambiente.
- Alejado del calor y de la humedad
- No guardar en el cuarto de baño o cocina para evitar la humedad y altas temperaturas.
- No lo utilice después de la fecha de caducidad que se indica en el envase (último día del mes indicado en el envase).
- Mantenga la medicación fuera del alcance de los niños.

¿Cómo puedo conseguir este medicamento?

- Este medicamento sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este centro.
- Devuelva al Servicio de Farmacia este medicamento si no va a utilizarlo.

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico

RECOMENDACIONES AL PACIENTE

Desayuno: **1** comprimido de Epclusa®

Semanas de tratamiento: _____

Fecha inicio:

Próximas visitas a Farmacia:

Último día de tratamiento:

Medicamentos concomitantes:

-
-
-
-
-
-
-

Unidad de Pacientes Externos.
Servicio de Farmacia. Horario: de 10-14h
Teléfono: 976765500/ Ext: 2575
Email: farmaciapexternos@salud.aragon.es

salud servicio aragonés de salud

INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

EPCLUSA®

Sofosbuvir/**Velpatasvir**

comprimidos



Servicio de Farmacia

Unidad de Pacientes Externos

Hospital Universitario Miguel Servet