POSOLOGÍA

TERIFLUNOMIDA se administra vía oral.

Está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con esclerosis múltiple remitente-recurrente.

La dosis en **adultos** es de **14mg/día**.

¿CÓMO se debe TOMAR Teriflunomida?

Puede tomar Teriflunomida **con o sin alimentos**.

Tome las cápsulas por vía oral con un vaso de agua, se deben tragar intactas, sin abrirlas, **a la misma hora todos los días.**

Si olvida tomar una dosis **NO** tome una dosis doble para compensar la dosis

¿Cuándo NO debe tomar Teriflunomida?

- Si tiene alergia a teriflunomida o excipientes (ha desarrollado una erupción cutánea o úlceras en la boca después de tomarlo).
- Problemas hepáticos graves
- Problemas renales que requieran diálisis
- Patologías que afecten al sistema inmunitario (p. ej. VIH)
- Problemas de médula ósea, bajo recuento de glóbulos blancos, plaquetas o hematíes
- Infección activa grave
- Número muy bajo de proteínas en sangre
- Embarazo o lactancia

.

PRECAUCIONES

- Si sufre problemas hepáticos y/o bebe cantidades importantes de alcohol
- Si tiene hipertensión
- Si tiene una infección activa
- Si tiene reacciones graves en la piel
- Si tiene problemas respiratorios
- Si tiene debilidad, entumecimiento y dolor en las manos y en los pies
- Vacunas atenuadas vivas
- Debe utilizar un método anticonceptivo eficaz durante y tras el tratamiento
- Puede provocar una falsa disminución del calcio en los análisis de sangre

INTERACCIONES

- Fármacos que afectan al sistema inmune: leflunomida, metotrexato
- Antibióticos o antivirales: Rifampicina, ciprofloxacino, bencilpenincilina, zidovudina
- Antiepilépticos: carbamazepina, fenobarbital, fenitoína
- Antidiabéticos: replaglinida, pioglitazona, nateglinida, rosiglitazona
- Antineoplásicos
- Antidepresivos: duloxetina
- Estatinas: rosuvastatina, atorvastatina, simvastatina…
- Anticogulante: warfarina
- Anticonceptivos orales: etinilestradiol, levonorgestrel
- AINES: indometacina, ketoprofeno
- Furosemida
- Otros: teofilina, tizanidina, furosemida, cimetidina, sulfasalazina, colestiramina, carbón activo, hierba de San Juan

EFECTOS ADVERSOS:

Los efectos adversos más frecuentes, que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son:

- Dolor de cabeza
- Dolor muscular
- **Diarrea, náuseas, vómitos**
- **Aumento de enzimas hepáticas (ALT)**
- **Pérdida de pelo**
- Hipertensión
- Erupción cutánea
- Disminución glóbulos blancos

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos estos efectos adversos o cualquier otro que crea que pueda estar relacionado.

Avise rápidamente a su médico si tiene:

- Si tiene tos y disnea (falta de aire) sin explicación
- Reacción alérgica
- Reacción grave en la piel
- Infecciones graves
- Síntomas de enfermedad de hígado (color amarillento de piel u ojos, orina más oscura, náuseas y vómitos o dolor abdominal)

CONSERVACIÓN

Mantenga los comprimidos en su envase original a temperatura ambiente, protegidas de la luz y de la humedad.

CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Lávese muy bien las manos después de manipular los comprimidos.

Este medicamento se dispensa en el Servicio de Farmacia del Hospital.

Si le cambian el tratamiento, devuelva la medicación sobrante a la farmacia del Hospital.

RECOMENDACIONES AL PACIENTE

NOTAS: Contiene lactosa

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento.

Si tiene cualquier duda o precisa más información, contacte con su médico o farmacéutico

¿CÓMO CONTACTAR?

Teléfono para solicitar cita: 876764239 (9:00 a 11:00)
Teléfono Farmacia: 976769569
farmaciapexternos@salud.aragon.es
Horario: Lunes a Viernes 9:00 – 15:00 h. Martes y Jueves de 15:30 a 19:00h con cita previa

Hospital Universitario Miguel Servet

Fecha revisión:

01/2024

INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

Teriflunomida

Comprimidos

Nombre del paciente:

Fecha: