HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
FARMACIA

Información de Medicamentos

TRIUMEQ 50mg/600mg/300mg

Dolutegravir/Abacavir/Lamivudina

Oral

Acciones: Medicamento utilizado para la infección producida por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Consideraciones: Puede tomar este medicamento CON o SIN alimentos.
Tome los comprimidos enteros, sin partir ni masticar, tragándolos con ayuda de un vaso de agua.
Siga estrictamente la pauta indicada por su médico en cuanto a dosis y frecuencia de administración.
Si ha olvidado tomar una dosis de Triumeq®, tómela tan pronto como sea posible, excepto si faltan menos de 4 horas para la siguiente dosis. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la próxima dosis.
Este medicamento no cura de la infección por VIH, pero retarda la progresión de la enfermedad, por eso, aunque se encuentre mejor, no deje de tomarlo.
Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Triumeq®. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico. No tome zumo de POMELO o HIERBA de SAN JUAN durante el tratamiento.
Informe inmediatamente a su médico si está embarazada o cree que puede estarlo, así como si quedase embarazada durante el tratamiento.
Avise a su médico si tiene algún hijo al que esté dándole el pecho.

Efectos adversos: Los efectos adversos más frecuentes son: molestias gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal), dolor de cabeza, mareo, insomnio, fatiga y reacciones de hipersensibilidad)
REACCIÓN DE HIPERSENSIBILIDAD:
Este medicamento puede provocar una reacción de hipersensibilidad o reacción alérgica grave para su salud. Cuando aparece, suele ocurrir en las primeras seis semanas de tratamiento (aunque puede ocurrir en cualquier momento) y empeora al continuarlo. Si se reconoce a tiempo su aparición no hay por qué preocuparse. Las personas que presentan el gen HLA-B (tipo 5701) tienen más probabilidad de experimentar esta reacción alérgica a abacavir. Sin embargo, aunque no tenga este tipo de gen sigue siendo posible que experimente esta reacción
Consulte a su médico INMEDIATAMENTE si nota cualquiera de los siguientes síntomas: fiebre, erupción cutánea, enrojecimiento y/o picores, náuseas, vómitos, diarrea o dolor abdominal, cansancio, malestar general, respiración entrecortada, dolor de garganta o tos.