


ABACAVIR/LAMIVUDINA 600/300 MG



¿Qué es ABACAVIR/LAMIVUDINA?

Es un medicamento que se utiliza para tratar la infección producida por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Este medicamento no cura la infección por VIH, reduce la cantidad de virus de su cuerpo, mejorando el sistema inmunitario y disminuyendo el riesgo de infecciones asociadas a la infección por el VIH, por eso, aunque se encuentre mejor, no deje de tomarlo.

ABACAVIR/LAMIVUDINA se utiliza en combinación con otros medicamentos contra el VIH.

El éxito del tratamiento depende de su correcto cumplimiento.

¿Qué dosis debo tomar?

Deberá tomar 1 comprimido de ABACAVIR/LAMIVUDINA una vez al día.

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

¿Cómo tomar ABACAVIR/LAMIVUDINA?

Deberá tomar la dosis indicada con o sin alimentos una vez al día, procurando que sea siempre a las mismas horas.

El comprimido se debe tragar entero, no fraccione, triture ni mastique los comprimidos.

¿Qué hago si olvido una dosis?

Si han pasado menos de 12 horas desde la hora prevista de la toma, tómelo en ese momento y después continúe su tratamiento de forma habitual. Si han pasado más de 12 horas, no tome la dosis olvidada y tome el medicamento a la dosis programada a la hora habitual.

En **caso de vómito** antes de treinta minutos después de haber tomado su dosis, tome otro comprimido. Si han pasado más de treinta minutos, no es necesario tomar otro comprimido.

No interrumpa su tratamiento sin hablar con el médico.

Si por alguna razón, ha dejado de tomar Abacavir/Lamivudina, especialmente porque piensa que tiene efectos adversos o por otra enfermedad, **consulte a su médico antes de volver a iniciar el tratamiento**. Su médico comprobará si sus síntomas estaban relacionados con una reacción de hipersensibilidad.

¿Cuándo no debo tomar ABACAVIR LAMIVUDINA^R?

- Si es alérgico, ABACAVIR O LAMIVUDINA o alguno de sus excipientes (amarillo anaranjado)
- Embarazo y lactancia.

Precauciones

- Medidas anticonceptivas
- Conducción, uso de maquinaria. ABACAVIR LAMIVUDINA puede hacer que se sienta mareado y puede tener otros efectos que reduzcan su atención, no conduzca si tiene algún efecto de este tipo.

Interacciones

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación, productos naturales, multivitamínicos y/o plantas medicinales que tome. Consulte con su médico o farmacéutico si comienza a tomar cualquier medicamento o producto farmacéutico o natural.

- Evite tomar medicamentos que contengan sorbitol.

¿Qué efectos adversos puedo tener?

- **Dolor de cabeza.**
- **Diarrea, dolor abdominal**
- **Náuseas**
- **Vómitos**
- **Pérdida de apetito**
- Cansancio, falta de energía
- Insomnio
- Mareo y/o somnolencia
- Erupción, pérdida del cabello
- Dolores musculares y de las articulaciones.

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

Avisé rápidamente a su médico si tiene:

- **Una reacción de hipersensibilidad grave**, algunas personas que toman abacavir pueden desarrollar una reacción alérgica grave para su salud. Cuando aparece, suele ocurrir en las primeras seis semanas de tratamiento y empeora al continuarlo. Si se reconoce a tiempo su aparición, no hay por qué preocuparse. **INFORME A SU MÉDICO INMEDIATAMENTE** si nota los siguientes síntomas: erupciones o manchas en la piel, fiebre, náuseas y vómitos, diarrea, dolor abdominal (estómago) y cansancio excesivo.
- Dolor y rigidez en las articulaciones, dificultad de movimiento.
- Palpitaciones, temblor, hiperactividad y/o debilidad muscular.

¿Cómo debo conservar LAMIVUDINA?

- Mantenga la medicación en su envase original a temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

CONTACTO

- Solicitud de citas: 876 76 42 39 (9:00 a 11:00)
- Teléfono para consultas o dudas: 976 76 95 69 (9:00 a 15:00)
- Email: farmaciapexternos@salud.aragon.es
- Horario: Lunes a Viernes: 9:00 – 15:00 h.
Martes y Jueves: 15:30 a 19:00h con cita previa