

CIBINQO®

ABROCITINIB



¿Qué es ABROCITINIB?

Es un medicamento indicado para el tratamiento de la dermatitis atópica de moderada a grave en adultos.

¿Qué dosis debo tomar?

Deberá tomar **UN** comprimido una **vez al día**.

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

¿Cómo tomar ABROCITINIB?

Deberá tomar la dosis indicada **con o sin alimentos**, procurando que sea siempre a las mismas horas.

Los comprimidos se deben tragar enteros con un vaso de agua, no se debe triturar, dividir, disolver, chupar ni masticar el comprimido.

¿Qué hago si olvido una dosis?

Si se le ha olvidado tomar una dosis, puede tomar la dosis tan pronto como lo recuerde excepto si quedan menos de 12 horas para la siguiente. En este caso omítala y tome la siguiente dosis en su horario habitual.

Nunca tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

¿Cuándo no debo tomar ABROCITINIB?

- Si tiene alergia a ABROCITINIB o a alguno de los excipientes. **Contiene lactosa**
- Si está embarazada o en periodo de lactancia.

Precauciones

- En caso de presentar problemas de hígado.
- Si tiene una infección grave en curso, incluyendo tuberculosis.
- Si ha tenido alguna vez una infección por herpes.
- Si alguna vez ha tenido hepatitis B o hepatitis C.
- Si se ha vacunado recientemente o planea recibir una vacuna.
- Tiene cáncer o ha tenido algún tipo de cáncer.
- Si tiene colesterol elevado en sangre.

Interacciones

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación, productos naturales, multivitamínicos y/o plantas medicinales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con ABROCITINIB son:

- Rifampicina.
- Antifúngicos: itraconazol, Ketoconazol, posaconazol, voriconazol.
- Antiepilépticos: fenitoína.
- Antidepresivos: fluvoxamina, fluoxetina.
- Inhibidores del ácido estomacal: antiácidos, omeprazol, ranitidina...
- Antiagregantes: ticlopidina.

¿Qué efectos adversos puedo tener?

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro **que crea que puede estar relacionado con la medicación**.

- Náuseas, vómitos, malestar
- Herpes labial
- Dolor de estómago
- Acné
- Aumento de una enzima llamada creatinfosfoquinasa en sus análisis de sangre

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

Avise rápidamente a su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave: enrojecimiento de la piel, dificultad para respirar...
- Erupción en la piel dolorosa con ampollas y fiebre (herpes zóster).
- Inflamación dolorosa de la pierna, dolor en el pecho, dificultad para respirar, respiración rápida o frecuencia cardíaca rápida.

¿Cómo debo conservar ABROCITINIB?

- Mantenga la medicación en su envase original a temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

CONTACTO

- Solicitud de citas: 876 76 42 39 (9:00 a 11:00)
- Teléfono para consultas o dudas: 976 76 95 69 (9:00 a 15:00)
- Email: farmaciapexternos@salud.aragon.es
- Horario: Lunes a Viernes: 9:00 – 15:00 h.
Martes y Jueves: 15:30 a 19:00h con cita previa