

AQUIPTA® ATOGEANT



¿Qué dosis debo tomar?

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

Deberá tomar UN comprimido de 60 mg diariamente.

¿Cómo tomar ATOGEANT?

Deberá tomar el comprimido cada día, con o sin alimentos, procurando que sea siempre a las mismas horas.

Los comprimidos se deben tragar enteros y no se deben partir, triturar ni masticar.

¿Qué hago si olvido una dosis?

- La dosis olvidada se debe tomar tan pronto como se recuerde.
Si se olvida durante un día entero, se debe omitir la dosis olvidada y tomar la siguiente dosis de acuerdo con la pauta programada.
- En caso de vómito, NO tome otra dosis ese día, y continúe su tratamiento con normalidad.

¿Cuándo no debo tomar ATOGEANT?

- Si es alérgico a ATOGEANT o alguno de sus excipientes
- Insuficiencia hepática grave
- Embarazo, lactancia

Precauciones

- Será necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal grave y en pacientes con enfermedad renal terminal.
- Si se produce una reacción de hipersensibilidad, se debe interrumpir la administración de ATOGEANT.
- ATOGEANT puede producir somnolencia en algunos pacientes, se debe tener precaución antes de conducir o utilizar máquinas hasta que estén

razonablemente seguros de que ATOGEPANT no afecta negativamente a su rendimiento.

Interacciones

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación, productos naturales, multivitamínicos y/o plantas medicinales que tome.

Algunos de los medicamentos que producen interacciones con ATOGEPANT son:

- Claritromicina
- Ritonavir
- Cobicistat
- Rifampicina
- Ciclosporina
- Posaconazol
- Voriconazol

¿Qué efectos adversos puedo tener?

- **Náuseas, estreñimiento.**
- Fatiga.
- Somnolencia.
- Disminución de peso.
- Daño hepático.
- Hipersensibilidad (erupción cutánea, prurito, urticaria, edema facial)

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

Avise rápidamente a su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave: enrojecimiento de la piel, dificultad para respirar...

¿Cómo debo conservar ATOGEPANT?

- Mantenga la medicación en su envase original a temperatura ambiente y protegido de la humedad.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

CONTACTO

- Solicitud de citas: 876 76 42 39 (9:00 a 11:00)
- Teléfono para consultas o dudas: 976 76 95 69 (9:00 a 15:00)
- Email: farmaciapexternos@salud.aragon.es
- Horario: Lunes a Viernes: 9:00 – 15:00 h.
 Martes y Jueves: 15:30 a 19:00h con cita previa