

## BIKTARVY®

### BICTEGRAVIR/EMTRICITABINA/TENOFOVIR ALAFENAMIDA 50/200/25 MG



#### ¿Qué es BIKTARVY®?

Es un medicamento que se utiliza para tratar la infección producida por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Este medicamento no cura de la infección por VIH, pero retarda la progresión de la enfermedad, reduce la cantidad de virus de su cuerpo, mejorando el sistema inmunitario y disminuyendo el riesgo de enfermedades asociadas a la infección por VIH, por eso, aunque se encuentre mejor, no deje de tomarlo.

El éxito del tratamiento depende de su correcto cumplimiento.

#### ¿Qué dosis debo tomar?

Deberá tomar 1 comprimido de BIKTARVY® una vez al día.

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

#### ¿Cómo tomar BIKTARVY®?

Deberá tomar la dosis indicada con o sin alimentos una vez al día, procurando que sea siempre a las mismas horas.

No fraccione, triture ni mastique los comprimidos, el comprimido se debe tragar entero, si no le es posible, divida el comprimido y tome cada mitad una detrás de otra, nunca separadas más de 10 minutos.

#### ¿Qué hago si olvido una dosis?

Si han pasado menos de 18 horas desde la hora prevista de la toma, tómelo en ese momento y después continúe su tratamiento de forma habitual. Si han pasado más de 18 horas, no tome la dosis olvidada y tome el medicamento a la dosis programada a la hora habitual.

**En caso de vómito, antes de una hora tras haber tomado su dosis, tome otro comprimido. Si ha pasado más de una hora no es necesario tomar otro comprimido.**

**No interrumpa el tratamiento sin hablar con el médico.**

#### ¿Cuándo no debo tomar BIKTARVY®?

- Si es alérgico a bictegravir, emtricitabina, tenofovir alafenamida o alguno de sus excipientes.
- Embarazo y lactancia.

#### Precauciones

- Utilizar medidas anticonceptivas.
- Conducción, manejo de maquinaria pesada. BIKTARVY® puede hacer que se sienta mareado y puede tener otros efectos que reduzcan su atención, no conduzca si tiene algún efecto de este tipo.

## Interacciones

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación, productos naturales, multivitamínicos y/o plantas medicinales que tome o comience a tomar una vez iniciado el tratamiento, ya que algunos pueden interferir con el uso de BIKTARVY®. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con BIKTARVY® son:

- Rifampicina, antibiótico para tratar la tuberculosis.
- Medicamentos antiepilépticos como carbamazepina, oxcarbazepina, fenobarbital y fenitoína,
- No tome **Hierba de San Juan (Hyperico)**.
- Si toma antiácidos que contienen aluminio y/o magnesio, suplementos de minerales o vitaminas que contienen magnesio o hierro, debe tomar BIKTARVY® **2 horas antes o 2 horas después junto con alimentos.**

## ¿Qué efectos adversos puedo tener?

Los efectos adversos más frecuentes asociados a este tratamiento son:

- **Dolor de cabeza**
- **Náuseas**
- **Diarrea**
- Cambios en el estado de ánimo
- Alteraciones en el sueño
- Mareo
- Cansancio

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

## **Avise rápidamente a su médico si tiene:**

- Signos de inflamación o infección.
- Signos de debilidad muscular que se inicia en manos y pies y se desplaza hacia el tronco.
- Palpitaciones, temblor o hiperactividad.

## ¿Cómo debo conservar BIKTARVY®?

- Mantenga la medicación en su envase original a temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

### CONTACTO

- Solicitud de citas: 876 76 42 39 (9:00 a 11:00)
- Teléfono para consultas o dudas: 976 76 95 69 (9:00 a 15:00)
- Email: [farmaciapexternos@salud.aragon.es](mailto:farmaciapexternos@salud.aragon.es)
- Horario: Lunes a Viernes: 9:00 – 15:00 h.  
Martes y Jueves: 15:30 a 19:00h con cita previa