

FUMARATO DE DIMETILO 240 MG



¿Qué es FUMARATO DE DIMETILO?

Es un medicamento indicado para el tratamiento de pacientes adultos con esclerosis múltiple remitente-recurrente.

¿Qué dosis debo tomar?

Habitualmente se inicia el tratamiento de forma escalonada:

1ª y 2ª semana: 120 mg cada 12h

3ª semana: 120 mg por la mañana y 240 mg por la noche

4ª semana en adelante: 240 mg cada 12h

La dosis de mantenimiento son 240 mg cada 12h

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

¿Cómo tomar FUMARATO DE DIMETILO?

Deberá tomar la dosis indicada **con alimentos**, procurando que sea siempre a las mismas horas.

Las cápsulas se deben tragar enteras con un vaso de agua, no se debe triturar, dividir, disolver, chupar ni masticar la cápsula o el contenido de la misma.

¿Qué hago si olvido una dosis?

Si se le ha olvidado tomar una dosis, puede tomar la dosis olvidada únicamente si deja pasar 4 horas entre dosis. Si no es así, debe esperar hasta la siguiente dosis programada a la hora habitual.

Nunca tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

¿Cuándo no debo tomar FUMARATO DE DIMETILO?

- Si tiene alergia a FUMARATO DE DIMETILO o a alguno de los excipientes.
- Ante sospecha o confirmación de Leucoencefalopatía multifocal progresiva.
- Si tiene recuento de glóbulos blancos muy bajo y durante un tiempo prolongado.
- Durante el embarazo o lactancia.

Precauciones

- Debe tener precaución en caso de insuficiencia renal o hepática grave.
- Si está en tratamiento con inmunosupresores.
- Si tiene enfermedad gastrointestinal activa.
- No debe recibir durante el tratamiento vacunas vivas o atenuadas.
- Lávese muy bien las manos después de manipular los comprimidos.

Interacciones

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación, productos naturales, multivitamínicos y/o plantas medicinales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con FUMARATO DE DIMETILO son:

- Medicamentos que afectan al sistema inmunitario como antineoplásicos, inmunomoduladores o inmunosupresores.
- Medicamentos que afectan a los riñones como antibióticos aminoglucósidos para tratar infecciones, diuréticos que aumentan la eliminación de orina, litio, y analgésicos antiinflamatorios como ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco...

¿Qué efectos adversos puedo tener?

Trastornos gastrointestinales: Náuseas y vómitos, diarrea, dolor abdominal, dispepsia, gastritis

Rubefacción

Gastroenteritis

Disminución del recuento de glóbulos rojos y blancos

Sensación de quemazón

Sofocos

Prurito, exantema, eritema, alopecia

Aumento de enzimas hepáticas

Albumina y cetonas en orina

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

Awise rápidamente a su médico si tiene:

- Signos de alergia grave
- Rubefacción intensa
- Una infección grave
- Signos o síntomas de infección por Herpes Zoster

¿Cómo debo conservar FUMARATO DE DIMETILO?

- Mantenga la medicación en su envase original a temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

CONTACTO

- Solicitud de citas: 876 76 42 39 (9:00 a 11:00)
- Teléfono para consultas o dudas: 976 76 95 69 (9:00 a 15:00)
- Email: farmaciapexternos@salud.aragon.es
- Horario: Lunes a Viernes: 9:00 – 15:00 h.
Martes y Jueves: 15:30 a 19:00h con cita previa