

DUPIXENT® DUPILUMAB



¿Qué es DUPILUMAB?

DUPIXENT® Dupilumab es un anticuerpo monoclonal humano, utilizado para el tratamiento de dermatitis atópica de moderada a grave en pacientes adultos y niños a partir de 6 años

¿Qué dosis debo tomar?

La dosis habitual de DUPILUMAB es 600mg (2 inyecciones) el día 1, seguido de 300mg (1 inyección) el día 14 y cada 14 días en adelante.

¿Cómo tomar DUPILUMAB?

- Se deberá administrar mediante inyección subcutánea según la pauta que le haya indicado su médico. En caso de dudas, consulte con su médico o farmacéutico.
- La inyección se puede administrar en abdomen, muslos o en la zona externa de la parte superior de los brazos (el brazo sólo se debe utilizar si la inyección la aplica otra persona que no sea el paciente).
- Debe alternar los lugares de inyección y las inyecciones no se deben administrar en zonas donde la piel sea sensible, esté dañada, enrojecida o endurecida.
- Para evitar molestias en el lugar de inyección, mantener la pluma a temperatura ambiente durante al menos 30 minutos antes de la inyección.

¿Qué hago si olvido una dosis?

Si olvidó una dosis de Dupilumab (DUPIXENT®), debe administrarla lo antes posible tras darse cuenta de ello.

Después póngase en contacto con su médico, quien le dirá cuándo se debe administrar la dosis siguiente.

¿Cuándo no debo tomar DUPILUMAB?

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

Precauciones

- Si es alérgico a dupilumab o alguno de sus excipientes (sacarosa)
- Embarazo y lactancia
- Si presenta conjuntivitis o queratitis
- Si tiene asma
- Si le van a vacunar con vacunas vivas

Interacciones

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. En principio no hay descritas interacciones con otros medicamentos.

¿Qué efectos adversos puedo tener?

Los efectos adversos frecuentes (no significa que aparezcan en todos los pacientes), son:

- Conjuntivitis, queratitis
- Picor ocular, ojo seco, blefaritis
- Herpes oral
- Reacciones alérgicas tales como erupción, hinchazón o urticaria.
- Reacciones en el lugar de inyección (eritema, dolor, hematomas)

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

Avisé rápidamente a su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave: enrojecimiento de la piel, dificultad para respirar...

¿Cómo debo conservar DUPILUMAB?

- En **nevera** (entre 2°C y 8°C). No congelar.
- Debe conservar la pluma precargada en el envase original para protegerla de la luz.
- No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.

CONTACTO

- Solicitud de citas: 876 76 42 39 (9:00 a 11:00)
- Teléfono para consultas o dudas: 976 76 95 69 (9:00 a 15:00)
- Email: farmaciapexternos@salud.aragon.es
- Horario: Lunes a Viernes: 9:00 – 15:00 h.
Martes y Jueves: 15:30 a 19:00h con cita previa