

## EDURANT®

### RILPIVIRINA 25 MG



#### ¿Qué es EDURANT®?

Es un medicamento que se utiliza para tratar la infección producida por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Este medicamento no cura la infección por VIH, reduce la cantidad de virus de su cuerpo, mejorando el sistema inmunitario y disminuyendo el riesgo de infecciones asociadas a la infección por el VIH, por eso, aunque se encuentre mejor, no deje de tomarlo.

EDURANT® siempre se utiliza combinado con otros medicamentos contra el VIH.

El éxito del tratamiento depende de su correcto cumplimiento.

#### ¿Qué dosis debo tomar?

Deberá tomar 1 comprimido de 25 mg una vez al día.

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

#### ¿Cómo tomar EDURANT®?

Deberá tomar la dosis indicada siempre **con alimentos** (comidas calóricas), procurando que sea siempre a las mismas horas. Una bebida nutricional, aunque sea rica en proteínas, no sustituye a una comida.

El comprimido se debe tragar entero, no fraccione, triture ni mastique los comprimidos.

#### ¿Qué hago si olvido una dosis?

Si han pasado menos de 12 horas desde la hora prevista de la toma, tómelo en ese momento y después continúe su tratamiento de forma habitual. Si han pasado más de 12 horas, no tome la dosis olvidada y tome el medicamento a la dosis programada a la hora habitual.

**En caso de vómito**, tome otra dosis si han pasado menos de cuatro horas desde que tomó el medicamento, tómelo con alimentos, y posteriormente continúe con su pauta habitual. Si han pasado más de cuatro horas no es necesario tomar otro comprimido.

**No interrumpa el tratamiento sin hablar con el médico.**

#### ¿Cuándo no debo tomar EDURANT®?

- Si es alérgico a rilpivirina o alguno de sus excipientes (lactosa)
- Embarazo o lactancia.

#### Precauciones

- Medidas anticonceptivas
- Conducción y manejo de maquinaria, EDURANT® puede hacer que se sienta mareado y puede tener otros efectos que reduzcan su atención, no conduzca si tiene algún efecto de este tipo.

## Interacciones

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación, productos naturales, multivitamínicos y/o plantas medicinales que tome, o comience a tomar una vez iniciado el tratamiento, ya que algunos pueden interferir con el uso de EDURANT®. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con EDURANT® son:

- Antiepilépticos como: Carbamacepina, oxcarbacepina, fenobarbital y fenitoína.
- Antibióticos para tratar la tuberculosis como rifampicina y rifapentina.
- Dexametasona, excepto como tratamiento de dosis única.
- Medicamentos para tratar problemas de estómago como: Omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol y rabeprazol
- Si le han recetado famotidina, debe tomar este medicamento **12 horas antes o 4 horas después** que EDURANT®.
- Antiácidos, para tratar la acidez de estómago, se deben tomar **al menos 2 horas antes o 4 horas después**.
- Multivitamínicos, suplementos de calcio o hierro, se deben tomar junto con una comida, y si no es posible, se deben tomar **6 horas antes o 4 horas después** de tomar EDURANT®.
- No tome Hierba de San Juan o Hipérico.

## ¿Qué efectos adversos puedo tener?

Los efectos adversos más frecuentes asociados a este tratamiento son:

- **Dolor de cabeza**
- **Náuseas**
- **Dificultad para conciliar el sueño**
- **Mareo**
- **Alteraciones analíticas como aumento del colesterol**
- Sueños anormales, depresión
- Dolor abdominal, vómitos
- Fatiga, somnolencia

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

## Avise rápidamente a su médico si tiene:

- Signos o síntomas de infección o inflamación, fiebre, escalofríos, sudores y/o reacción cutánea grave.
- Debilidad muscular, palpitaciones, temblor o hiperactividad.
- Depresión, pensamientos o comportamientos inusuales.

## ¿Cómo debo conservar EDURANT®?

- Mantenga la medicación en su envase original a temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

### CONTACTO

- Solicitud de citas: 876 76 42 39 (9:00 a 11:00)
- Teléfono para consultas o dudas: 976 76 95 69 (9:00 a 15:00)
- Email: [farmaciapexternos@salud.aragon.es](mailto:farmaciapexternos@salud.aragon.es)
- Horario: Lunes a Viernes: 9:00 – 15:00 h.  
Martes y Jueves: 15:30 a 19:00h con cita previa