

EPCLUSA®

Sofosbuvir + Velpatasvir



¿Qué es EPCLUSA®?

Sofosbuvir + Velpatasvir

(Epclusa®) es una combinación de dos medicamentos antivíricos utilizados en adultos, para tratar la hepatitis C crónica.

¿Cómo se debe tomar?

1 comprimido UNA vez al día CON o SIN ALIMENTOS.

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

Lávese las manos antes y después de cada toma.

Deben tragarse enteros con un vaso de agua sin disolverlos, ni masticar, ni chupar.

¿Qué hago si olvido una dosis?

Si se ha olvidado de tomar una dosis, tómela lo antes posible y a continuación tome la siguiente dosis a su hora habitual. Si han transcurrido más de 18 horas espere a la siguiente toma.

Si vomita en un plazo de 3 horas después de la toma de Epclusa®, debe tomar un comprimido adicional, si vomita en un periodo posterior a las 3 horas no debe tomar ninguna dosis adicional.

No tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Cuándo no debo tomar EPCLUSA®?

Si usted es alérgico a sofosbuvir o velpatasvir.

Si está embarazada o en período de lactancia

Precauciones

Si se queda embarazada debe informar inmediatamente a su médico

Interacciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma:

- Antibióticos: rifampicina, rifabutina Antiepilépticos: fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, oxcarbamacepina, eslicarbazepina
- Antivirales: efavirenz.
- Estatinas.
- Anticoagulantes orales.
- Amiodarona
- Digoxina.
- Hierba de San Juan (hipérico) Antiácidos:
- Separación de 4 horas entre Epclusa® y antiácido (ej. hidróxido de aluminio, de magnesio)
- Administración simultánea con ranitidina, famotidina.
- Evitar omeprazol, pantoprazol, en caso necesario, tomar Epclusa® con alimentos y 4 horas antes de estos antiácidos (máx. 20mg omeprazol/día)

¿Qué efectos adversos puedo tener?

Los efectos adversos más frecuentes, que no significa que aparezcan en todos los pacientes son:

- Cansancio intenso, fatiga, sensación de debilidad o falta de energía.
- Cefalea
- Náuseas

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

Avise rápidamente a su médico si tiene

- Una reacción alérgica grave (enrojecimiento de la piel, dificultad para respirar...)
- En caso de sobredosis

¿Cómo debo conservar EPCLUSA®?

- Mantenga la medicación en su envase original a temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz.
- Mantenga la medicación fuera del alcance de los niños.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.

CONTACTO

- Solicitud de citas: 876 76 42 39 (9:00 a 11:00)
- Teléfono para consultas o dudas: 976 76 95 69 (9:00 a 15:00)
- Email: farmaciapexternos@salud.aragon.es
- Horario: Lunes a Viernes: 9:00 – 15:00 h.
Martes y Jueves: 15:30 a 19:00h con cita previa