


AIMOVIG® ERENUMAB



¿Qué es AIMOVIG® (ERENUMAB)?

Es un anticuerpo monoclonal humano utilizado para prevenir la migraña en adultos.

¿Qué dosis se debe administrar?

Su médico le indicará cual es la dosis que se debe administrar, en función de sus características.

ERENUMAB 70 mg se administra **una vez cada 4 semanas**.

ERENUMAB 140 mg se administra **una vez cada 4 semanas**.

¿Cómo se debe administrar AIMOVIG® (ERENUMAB)?

La dosis se administra como inyección subcutánea.

La inyección se puede administrar en el abdomen, muslos o en la zona externa de la parte superior de los brazos (el brazo sólo se debe utilizar si la inyección la aplica otra persona que no sea el paciente). Se recomienda alternar el lugar de inyección.

No se debe administrar en zonas donde la piel esté dañada, enrojecida o endurecida.

Para evitar molestias en el lugar de inyección, se recomienda sacar la pluma de la nevera al menos 30 minutos antes de la inyección.

- Lávese las manos y limpie la zona de inyección con alcohol.
- Retire el capuchón blanco o naranja (según la dosis) de la pluma. Desde ese momento la inyección se debe administrar en el plazo máximo de 5 minutos.
- Coja la pluma con cuatro dedos, dejando el pulgar hacia arriba, y con la ventana de inspección de la pluma hacia usted.
- En un ángulo de 90°, presione la pluma contra la zona de inyección de su cuerpo.
- Presione con el pulgar el botón de la pluma, escuchará un clic; en este momento habrá empezado la inyección. La ventana de inspección empezará a ponerse amarilla. Suelte el botón.
- Mantener la pluma contra la piel unos 15 segundos, hasta que la ventana de inspección de la pluma esté completamente amarilla y podrá oír un segundo clic.

¿Qué hago si olvido una dosis?

Si olvida una dosis de AIMOVIG® (ERENUMAB) debe administrársela lo antes posible tras darse cuenta de ello.

Después póngase en contacto con su médico, quien le dirá cuándo se debe administrar la dosis siguiente.

¿Cuándo no debo tomar AIMOVIG® (ERENUMAB)?

- Si tiene alergia a ERENUMAB o a alguno de los excipientes.

Precauciones

- Embarazo y lactancia. Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.
- Alergia al látex, el envase de este medicamento contiene látex de caucho en el capuchón.

Interacciones

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación, productos naturales, multivitamínicos y/o plantas medicinales que tome.

ERENUMAB es un medicamento biológico, hasta el momento, no se han descrito interacciones relevantes entre AIMOVIG® y otros medicamentos.

¿Qué efectos adversos puedo tener?

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

- Reacciones en el lugar de la inyección (enrojecimiento, picor, hinchazón, dolor).
- Estreñimiento.
- Espasmos musculares
- Picor

Avise rápidamente a su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave, con síntomas como erupción o inflamación de la cara, boca, lengua o garganta, enrojecimiento de la piel o dificultad para respirar.
- Estreñimiento grave con dolor abdominal fuerte o constante y vómitos.

¿Cómo debo conservar AIMOVIG® (ERENUMAB)?

- El medicamento se debe mantener en nevera a una temperatura entre 2º-8ºC.
- No congelar.
- Mantenga la medicación en su envase original para protegerla de la luz.
- Una vez utilizada la pluma deséchela en un contenedor para objetos punzantes inmediatamente después de su uso.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

CONTACTO

- Solicitud de citas: 876 76 42 39 (9:00 a 11:00)
- Teléfono para consultas o dudas: 976 76 95 69 (9:00 a 15:00)
- Email: farmaciapexternos@salud.aragon.es
- Horario: Lunes a Viernes: 9:00 – 15:00 h.
Martes y Jueves: 15:30 a 19:00h con cita previa