

AJOVY® FRENAMEZUMAB



¿Qué es AJOVY® (FRENAMEZUMAB)?

Es un anticuerpo monoclonal humano utilizado para prevenir la migraña en adultos.

¿Qué dosis se debe administrar?

Su médico le indicará la dosis que se debe administrar.

Se administra una dosis de 225 mg **una vez cada 4 semanas**.

¿Cómo se debe administrar AJOVY® (FRENAMEZUMAB)?

La dosis se administra como inyección subcutánea.

La inyección se puede administrar en el abdomen, muslos o en la zona externa de la parte superior de los brazos (el brazo sólo se debe utilizar si la inyección la aplica otra persona que no sea el paciente). Se recomienda alternar el lugar de inyección.

No se debe administrar en zonas donde la piel esté dañada, enrojecida o endurecida.

Para evitar molestias en el lugar de inyección, se recomienda sacar la pluma de la nevera al menos 30 minutos antes de la inyección.

- Lávese las manos y limpie la zona de inyección con alcohol.
- Retire el capuchón de la pluma.
- En un ángulo de 90°, presione la pluma contra la zona de inyección de su cuerpo.
- Escuchará un clic, en este momento habrá empezado la inyección, y el émbolo azul comenzará a desplazarse.
- Oirá un segundo clic unos 15 segundos después del primer clic, el émbolo se desplazará hacia la parte inferior de la ventana de visualización a medida que el medicamento se inyecte.
- Mantenga la pluma contra la piel otros 10 segundos más para asegurarse que se ha inyectado todo el medicamento.

¿Qué hago si olvido una dosis?

Si olvida una dosis de AJOVY® (FRENAMEZUMAB) debe administrársela lo antes posible tras darse cuenta de ello.

No debe administrarse una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

Después póngase en contacto con su médico, quien le dirá cuándo se debe administrar la dosis siguiente.

¿Cuándo no debo tomar AJOVY® (FRENAMEZUMAB)?

- Si tiene alergia a FRENAMEZUMAB o a alguno de los excipientes.

Precauciones

- Embarazo y lactancia. Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Interacciones

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación, productos naturales, multivitamínicos y/o plantas medicinales que tome.

FRENAMEZUMAB es un medicamento biológico, hasta el momento no se han descrito interacciones relevantes entre AJOVY® y otros medicamentos.

¿Qué efectos adversos puedo tener?

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

- **Reacciones en el lugar de la inyección (dolor, enrojecimiento, endurecimiento).**
- Picor en el lugar de inyección, eritema.

Avise rápidamente a su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave, con síntomas como erupción o inflamación de la cara, boca, lengua o garganta, gran enrojecimiento de la piel o dificultad para respirar.

¿Cómo debo conservar AJOVY® (FRENAMEZUMAB)?

- El medicamento se debe mantener en nevera a una temperatura entre 2º-8ºC.
- No congelar.
- Mantenga la medicación en su envase original para protegerla de la luz.
- Una vez utilizada la pluma deséchela en un contenedor para objetos punzantes inmediatamente después de su uso.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

CONTACTO

- Solicitud de citas: 876 76 42 39 (9:00 a 11:00)
- Teléfono para consultas o dudas: 976 76 95 69 (9:00 a 15:00)
- Email: farmaciapexternos@salud.aragon.es
- Horario: Lunes a Viernes: 9:00 – 15:00 h.
Martes y Jueves: 15:30 a 19:00h con cita previa