

VUMERITY®

FUMARATO DE DIROXIMEL 231 MG



¿Qué es VUMERITY® (FUMARATO DE DIROXIMEL)?

Es un medicamento indicado para el tratamiento de pacientes adultos con esclerosis múltiple remitente-recurrente.

¿Qué dosis debo tomar?

Habitualmente se inicia el tratamiento de forma escalonada:

1ª semana: **1 cápsula** de 231 mg **cada 12h**

2ª semana y sucesivas **2 cápsulas** de 231 mg **cada 12 horas**(462 mg dos veces al día).

Su médico puede reducirle temporalmente la dosis a 1 cápsula dos veces al día, para reducir la aparición de reacciones adversas gastrointestinales y rubefacción.

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

¿Cómo tomar VUMERITY® (FUMARATO DE DIROXIMEL)?

Puede tomar este medicamento **con o sin alimentos** alimentos, procurando que sea siempre a las mismas horas. La toma con alimentos puede ayudar a mejorar la tolerabilidad.

Las cápsulas se deben tragar enteras con un vaso de agua, no se debe triturar, dividir, disolver, chupar ni masticar la cápsula o el contenido de la misma.

¿Qué hago si olvido una dosis?

Si se le ha olvidado tomar una dosis, puede tomar la dosis olvidada únicamente si deja pasar 4 horas entre dosis. Si no es así, debe esperar hasta la siguiente dosis programada a la hora habitual.

Nunca tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

¿Cuándo no debo tomar VUMERITY® (FUMARATO DE DIROXIMEL)?

- Si tiene alergia a fumarato de diroximel o a alguno de los excipientes.
- Si está embarazado o cree que puede estarlo.
- Ante sospecha o confirmación de Leucoencefalopatía multifocal progresiva.

Precauciones

- Debe utilizar medidas anticonceptivas eficaces durante el tratamiento.
- Evite la lactancia materna durante el tratamiento.
- No debe recibir vacunas de virus vivos o atenuadas.
- Debe tener precaución si padece insuficiencia renal o hepática grave o una enfermedad gastrointestinal activa.

Interacciones

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación, productos naturales, multivitamínicos y/o plantas medicinales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con FUMARATO DE DIROXIMEL son:

- Medicamentos que afectan al sistema inmunitario como antineoplásicos, inmunosupresores.
- Medicamentos que afectan a los riñones, como antibióticos para tratar infecciones (aminoglucósidos), diuréticos que aumentan la eliminación de orina, litio, analgésicos antiinflamatorios como ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco...

¿Qué efectos adversos puedo tener?

- **Trastornos gastrointestinales: Náuseas, diarrea, dolor abdominal**, vómitos dispepsia, gastritis, gastroenteritis
- **Rubefacción**, sofocos.
- Disminución del recuento de glóbulos blancos.
- Sensación de quemazón.
- Prurito, exantema, eritema, pérdida de cabello.
- Aumento de enzimas hepáticas.
- Cetonas detectadas en orina.

Comente a su médico o farmacéutico, si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

Avise rápidamente a su médico si tiene:

- Signos de alergia grave.
- Rubefacción intensa con erupción cutánea, hinchazón de la cara, y/o dificultad para respirar, mareos o pérdida del conocimiento.
- Signos o síntomas de infección por Herpes Zóster o infección grave.
- Debilidad nueva o empeoramiento de la debilidad, torpeza; cambios en la visión, en el pensamiento o en la memoria; o confusión o cambios de personalidad, o dificultad para hablar y comunicarse.

¿Cómo debo conservar VUMERITY® (FUMARATO DE DIROXIMEL)?

- Mantenga la medicación en su envase original a temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

CONTACTO

- Solicitud de citas: 876 76 42 39 (9:00 a 11:00)
- Teléfono para consultas o dudas: 976 76 95 69 (9:00 a 15:00)
- Email: farmaciapexternos@salud.aragon.es
- Horario: Lunes a Viernes: 9:00 – 15:00 h.
Martes y Jueves: 15:30 a 19:00h con cita previa