

EMGALITY® GALCANEZUMAB



¿Qué es EMGALITY® (GALCANEZUMAB)?

Es un anticuerpo monoclonal humano utilizado para prevenir la migraña en adultos.

¿Qué dosis se debe administrar?

La primera dosis inicial de tratamiento es de 240 mg (2 inyecciones administradas a la vez).

Las siguientes dosis que se deben administrar son de 120 mg (una inyección) de GALCANEZUMAB **una vez al mes**.

¿Cómo se debe administrar EMGALITY® (GALCANEZUMAB)?

La dosis se administra como inyección subcutánea (bajo la piel).

La inyección se puede administrar en el abdomen, muslos o en la zona externa de la parte superior de los brazos o en el glúteo (el brazo o glúteo sólo se debe utilizar si la inyección la aplica otra persona que no sea el paciente). Se recomienda alternar el lugar de inyección.

No se debe administrar en zonas donde la piel esté dañada, enrojecida o endurecida.

- Lávese las manos y limpie la zona de inyección con alcohol.
- Retire el protector de la aguja.
- Sujete un pliegue de piel en el lugar donde va a realizar la inyección.
- Inserte la aguja con un ángulo de 45°
- Empuje lentamente el émbolo hasta el fondo hasta que se inyecte todo el medicamento.
- Retire la guja de su piel y suelte el pliegue de piel.
- Tire la jeringa a un contenedor de objetos punzantes.

¿Qué hago si olvido una dosis?

Si olvida una dosis de EMGALITY® (GALCANEZUMAB) debe administrársela lo antes posible tras darse cuenta de ello.

Después póngase en contacto con su médico, quien le dirá cuándo se debe administrar la dosis siguiente.

¿Cuándo no debo tomar EMGALITY® (GALCANEZUMAB)?

- Si tiene alergia a GALCAZENUMAB o a alguno de los excipientes.

Precauciones

- Embarazo y lactancia. Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Interacciones

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación, productos naturales, multivitamínicos y/o plantas medicinales que tome.

GALCANEZUMAB es un medicamento biológico, hasta el momento, no se han descrito interacciones relevantes entre EMGALITY® y otros medicamentos.

¿Qué efectos adversos puedo tener?

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

- **Reacciones en el lugar de la inyección (enrojecimiento, picor, hinchazón, dolor).**
- Vértigo.
- Estreñimiento.
- Picor.
- Erupción cutánea.

Avisé rápidamente a su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave, con síntomas como erupción, inflamación de la cara, boca, lengua o garganta, enrojecimiento de la piel o dificultad para respirar.

¿Cómo debo conservar EMGALITY® (GALCANEZUMAB)?

- El medicamento se debe mantener en nevera a una temperatura entre 2º-8ºC.
- No congelar.
- Mantenga la medicación en su envase original para protegerla de la luz.
- Una vez utilizado el inyectable, deséchelo en un contenedor para objetos punzantes inmediatamente después de su uso.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

CONTACTO

- Solicitud de citas: 876 76 42 39 (9:00 a 11:00)
- Teléfono para consultas o dudas: 976 76 95 69 (9:00 a 15:00)
- Email: farmaciapexternos@salud.aragon.es
- Horario: Lunes a Viernes: 9:00 – 15:00 h.
Martes y Jueves: 15:30 a 19:00h con cita previa