


## LEQVIO®

### INCLISIRAN 284 MG



#### ¿Qué es LEQVIO® (INCLISIRAN)?

Es un medicamento que reduce los niveles de colesterol limitando la producción de una proteína que aumenta los niveles de colesterol, está indicado en el tratamiento de la hipercolesterolemia o dislipemia mixta.

#### ¿Qué dosis se debe administrar?

Dosis inicial	284 mg primer día
Segunda dosis	284 mg a los 3 meses
Dosis sucesivas	284 mg cada 6 meses

#### ¿Cómo se debe administrar LEQVIO® (INCLISIRAN)?

La dosis se administra como inyección subcutánea.

La inyección se administra en el abdomen, algunos lugares alternativos de inyección son la parte superior del brazo o el muslo.

No se debe administrar en zonas donde la piel esté dañada, enrojecida o endurecida.

Cada dosis se debe administrar por un profesional sanitario.

Se le dispensará el medicamento desde el Servicio de Farmacia Hospitalaria, para que se lo administren posteriormente en Hospital de Día.

#### ¿Qué ocurre si se retrasa o se omite una dosis?

Si se retrasa la administración de una dosis durante un **periodo inferior a 3 meses**, se debe administrar la dosis olvidada y mantener la dosificación de acuerdo al calendario inicial del paciente.

Si se retrasa la administración de una dosis durante un **periodo superior a 3 meses**, se debe iniciar un nuevo calendario de dosificación. Se debe administrar nuevamente una dosis inicial, otra a los 3 meses y posteriormente cada 6 meses.

#### ¿Cuándo no debo tomar LEQVIO® (INCLISIRAN)?

- Si tiene alergia a INCLISIRAN o a alguno de los excipientes.

## Precauciones

- Hemodiálisis, al ser un medicamento que se elimina por vía renal, no se debe realizar una hemodiálisis hasta al menos 72 horas después de la administración de LEQVIO®
- Embarazo y lactancia. Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

## Interacciones

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación, productos naturales, multivitamínicos y/o plantas medicinales que tome.

No se han descrito interacciones relevantes entre LEQVIO® y otros medicamentos.

## ¿Qué efectos adversos puedo tener?

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

- Reacciones en el lugar de la inyección (enrojecimiento, picor, hinchazón, dolor).
- Dolor de las articulaciones
- Bronquitis

## Avise rápidamente a su médico si tiene:

Una reacción alérgica grave, enrojecimiento de la piel, dificultad para respirar, hinchazón de cara, lengua o garganta.

## ¿Cómo se debe conservar LEQVIO® (INCLISIRAN)?

- Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

### CONTACTO

- Solicitud de citas: 876 76 42 39 (9:00 a 11:00)
- Teléfono para consultas o dudas: 976 76 95 69 (9:00 a 15:00)
- Email: [farmaciapexternos@salud.aragon.es](mailto:farmaciapexternos@salud.aragon.es)
- Horario: Lunes a Viernes: 9:00 – 15:00 h.  
Martes y Jueves: 15:30 a 19:00h con cita previa