

ISENTRESS®

RALTEGRAVIR 400 MG



¿Qué es ISENTRESS®?

Es un medicamento que se utiliza para tratar la infección producida por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Este medicamento no cura la infección por VIH, pero retarda la progresión de la enfermedad, reduce la cantidad de virus de su cuerpo, mejorando el sistema inmunitario y disminuyendo el riesgo de enfermedades asociadas a la infección por VIH, por eso, aunque se encuentre mejor, no deje de tomarlo.

ISENTRESS® se utiliza combinado con otros medicamentos contra el VIH.

El éxito del tratamiento depende de su correcto cumplimiento.

¿Qué dosis debo tomar?

Deberá tomar 1 comprimido de ISENTRESS® dos veces al día.

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

¿Cómo tomar ISENTRESS®?

Deberá tomar la dosis indicada con o sin alimentos dos veces al día, procurando que sea siempre a las mismas horas.

El comprimido se debe tragar entero, no fraccione, triture ni mastique los comprimidos.

¿Qué hago si olvido una dosis?

Si han pasado menos de 6 horas desde la hora prevista de la toma, tómelo en ese momento, y después continúe su tratamiento de la forma habitual. Si han pasado más de 6 horas, no tome la dosis olvidada y tome el medicamento a la dosis programada a la hora habitual.

Si vomita antes de una hora tras haber tomado su dosis, tome otro comprimido. Si ha pasado más de una hora no es necesario tomar otro comprimido.

No interrumpa el tratamiento sin hablar con el médico.

¿Cuándo no debo tomar ISENTRESS®?

- Si es alérgico a RALTEGRAVIR o alguno de sus excipientes (lactosa, alcohol polivinílico).
- Lactancia.

Precauciones

- Conducción, manejo de maquinaria, ISENTRESS® puede hacer que se sienta mareado y puede tener otros efectos que reduzcan su atención, no conduzca si tiene algún efecto de este tipo.

Interacciones

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación, productos naturales, multivitamínicos y/o plantas medicinales que tome. Consulte con su médico o farmacéutico si comienza a tomar cualquier medicamento o producto farmacéutico o natural.

Algunos de los medicamentos que producen interacciones con ISENTRESS® son:

- Rifampicina, antibiótico utilizado para tratar infecciones como la tuberculosis.
- Antiácidos que contienen sales de aluminio y/o magnesio y se utilizan para tratar el ardor de estómago
- Si se toman suplementos de hierro, se debe esperar al menos **dos horas** entre la toma de estos medicamentos y la toma de ISENTRESS®.

¿Qué efectos adversos puedo tener?

- **Dolor de cabeza**
- **Náuseas**
- **Dolor abdominal, diarrea, gases**
- Disminución del apetito
- Erupción
- Cansancio
- Mareo
- Trastornos del sueño, insomnio, pesadillas.
- Depresión

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

Avisé rápidamente a su médico si tiene:

- Síntomas de infección o inflamación u otros síntomas como por ejemplo debilidad muscular, palpitaciones, temblor o hiperactividad.
- Erupción grave o erupción acompañada de fiebre malestar general, fatiga, dolores musculares y de las articulaciones.
- Síntomas de depresión graves, pensamientos o comportamientos inusuales.

¿Cómo debo conservar ISENTRESS®?

- Mantenga la medicación en su envase original a temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

CONTACTO

- Solicitud de citas: 876 76 42 39 (9:00 a 11:00)
- Teléfono para consultas o dudas: 976 76 95 69 (9:00 a 15:00)
- Email: farmaciapexternos@salud.aragon.es
- Horario: Lunes a Viernes: 9:00 – 15:00 h.
Martes y Jueves: 15:30 a 19:00h con cita previa