

JULUCA®

DOLUTEGRAVIR/RILPIVIRINA 50/25 mg



¿Qué es JULUCA®?

Es un medicamento que se utiliza para tratar la infección producida por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Este medicamento no cura la infección por VIH, reduce la cantidad de virus de su cuerpo, mejorando el sistema inmunitario y disminuyendo el riesgo de infecciones asociadas a la infección por el VIH, por eso, aunque se encuentre mejor, no deje de tomarlo.

El éxito del tratamiento depende de su correcto cumplimiento

¿Qué dosis debo tomar?

Deberá tomar 1 comprimido de JULUCA® una vez al día.

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

¿Cómo tomar JULUCA®?

Deberá tomar la dosis indicada, **con alimentos** una vez al día, procurando que sea siempre a las mismas horas.

El comprimido se debe tragar entero, no fraccione, triture ni mastique los comprimidos.

¿Qué hago si olvido una dosis?

Si han pasado menos de 12 horas desde la hora prevista de la toma, tómelo en ese momento y después continúe su tratamiento de forma habitual. Si han pasado más de 12 horas, no tome la dosis olvidada y tome el medicamento a la dosis programada a la hora habitual.

Si vomita antes de que pasen 4 horas tras haber tomado el medicamento, tome otro comprimido con una comida. Si han pasado más de cuatro horas no es necesario tomar otro comprimido.

No interrumpa el tratamiento sin hablar con el médico

¿Cuándo no debo tomar JULUCA®?

- Si es alérgico a DOLUTEGRAVIR, RILPIVIRINA o alguno de sus excipientes (lactosa, manitol)
- Embarazo y lactancia. Usar este medicamento durante el embarazo puede producir daño al feto.
- Si está tomando un medicamento llamado fampridina

Precauciones

- Medidas anticonceptivas.
- Conducción y uso de maquinaria, JULUCA® puede hacer que se sienta mareado y puede tener otros efectos que reduzcan su atención, no conduzca si tiene algún efecto de este tipo.

Interacciones

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación, productos naturales, multivitamínicos y/o plantas medicinales que tome, o comience a tomar una vez iniciado el tratamiento, ya que algunos pueden interferir con el uso de JULUCA®. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con JULUCA® son:

- Antiepilépticos como: Carbamacepina, oxcarbacepina, fenobarbital y fenitoína.
- Antibióticos para tratar la tuberculosis como rifampicina y rifapentina.
- Dexametasona, excepto como tratamiento de dosis única.
- Medicamentos para tratar problemas de estómago como: Omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol y rabeprazol
- Si le han recetado Famotidina, debe tomar este medicamento **12 horas antes o 4 horas después** de tomar JULUCA®
- Antiácidos, para tratar la acidez de estómago, se deben tomar **6 horas antes o 4 horas después**.
- Multivitamínicos, suplementos de calcio o hierro, se deben tomar junto con JULUCA® con una comida, y si no es posible, se deben tomar **6 horas antes o 4 horas después** de tomar JULUCA®.
- No debe tomar Hierba de San Juan o Hipérico.

¿Qué efectos adversos puedo tener?

Los efectos adversos más frecuentes asociados a este tratamiento son:

- **Dolor de cabeza**
- **Mareo**
- **Náuseas**
- **Diarrea**
- **Alteraciones del sueño como insomnio o pesadillas**
- **Alteraciones analíticas**

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

Avisé rápidamente a su médico si tiene:

- Signos o síntomas de reacciones de hipersensibilidad como erupción grave, fiebre, fatiga, dolor muscular o articular, ampollas, lesiones orales, conjuntivitis, edema facial.
- Depresión, pensamientos o comportamientos inusuales.
- Coloración amarillenta de la piel u orina anormalmente oscura.

¿Cómo debo conservar JULUCA®?

- Mantenga la medicación en su envase original a temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz. No quite el desecante que lleva el frasco.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

CONTACTO

- Solicitud de citas: 876 76 42 39 (9:00 a 11:00)
- Teléfono para consultas o dudas: 976 76 95 69 (9:00 a 15:00)
- Email: farmaciapexternos@salud.aragon.es
- Horario: Lunes a Viernes: 9:00 – 15:00 h.
Martes y Jueves: 15:30 a 19:00h con cita previa