

## LAMIVUDINA



### ¿Qué es LAMIVUDINA?

LAMIVUDINA es un antivirico que impide la replicación viral, utilizado en el tratamiento del VIH en combinación con otros fármacos y la Hepatitis B para mantener la carga viral suprimida.

### ¿Cómo se debe tomar?

- Se administra por VÍA ORAL.
- La dosis recomendada es de **1 comprimido 1 vez al día**, CON o SIN ALIMENTOS.
- Deberá tragar los comprimidos enteros con un poco de agua. Se recomienda no masticar ni triturar el comprimido.

### ¿Qué hago si olvido una dosis?

- **Tómela si quedan MENOS de 12 horas para la próxima dosis**, y continúe su tratamiento con normalidad. En caso contrario, **no tome una dosis doble para compensar el olvido**
- En caso de vómito, tómela si ha pasado menos de 30 minutos desde que ha tomado el medicamento.

### ¿Cuándo no debo tomar LAMIVUDINA?

- Historial de alergia a Lamivudina o alguno de sus excipientes.

### Precauciones

- Las mujeres en edad fértil deben utilizar métodos anticonceptivos efectivos.
- Pregunte a su médico si está embarazada o en periodo de lactancia.
- Historial de enfermedad renal o hepática.

### Interacciones

**Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, producto dietético, vitamina o planta medicinal.**

Especialmente si toma:

- Antibióticos: Sulfametoxazol/Trimetoprim

### ¿Qué efectos adversos puedo tener?

Como todos los medicamentos, Lamivudina puede tener efectos adversos, aunque esto no significa que aparezcan en todos los pacientes. Los más comunes son:

- Diarrea, náuseas, vómitos
- Cansancio
- Insomnio
- Dolor de cabeza
- Dolor óseo/muscular
- Reacciones cutáneas

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

### **Avisé rápidamente a su médico si tiene:**

- Una reacción alérgica grave (enrojecimiento de la piel, dificultad para respirar)
- En caso de sobredosis.
- Angioedema

### ¿Cómo debo conservar LAMIVUDINA?

- Mantenga la medicación en su envase original a temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.

#### CONTACTO

- Solicitud de citas: 876 76 42 39 (9:00 a 11:00)
- Teléfono para consultas o dudas: 976 76 95 69 (9:00 a 15:00)
- Email: [farmaciapexternos@salud.aragon.es](mailto:farmaciapexternos@salud.aragon.es)
- Horario: Lunes a Viernes: 9:00 – 15:00 h.  
Martes y Jueves: 15:30 a 19:00h con cita previa