

## MAVIRET® GLECAPREVIR/PIBRENTASVIR



### ¿Qué es MAVIRET®?

Glecaprevir + Pibrentasvir (Maviret®) es una combinación de dos medicamentos antivíricos utilizados en adultos, para tratar la hepatitis C crónica.

### ¿Cómo se debe tomar?

- Debe tomar **3 comprimidos** UNA vez al día **CON ALIMENTOS**.
- El tratamiento deberá tomarlo durante las semanas que le haya indicado su médico.
- Deben tragarse enteros con un vaso de agua sin disolverlos, ni masticar, ni chupar.

### ¿Qué hago si olvido una dosis?

- Si se ha olvidado de tomar una dosis, tómela lo antes posible. Si han transcurrido más de 18 horas espere a la siguiente toma.
- Si vomita en un plazo de 3 horas después de la toma de Maviret®, debe repetir la dosis, si vomita pasadas estas 3 horas no debe tomar ninguna dosis adicional.
- **No tome una dosis doble** para compensar un olvido

### ¿Cuándo no debo tomar MAVIRET®?

- Si usted es alérgico a glecaprevir, pibrentasvir, así como a algunos de los componentes del comprimido (lactosa)
- Si está embarazada o en periodo de lactancia.

### Precauciones

- Si se queda embarazada debe informar inmediatamente a su médico.

### Interacciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma:

- Antibióticos: rifampicina
- Antiepilépticos: fenitoína, carbamazepina, eslicarbazepina, oxcarbazepina, fenobarbital.
- Antivirales: atazanavir, darunavir, lopinavir, efavirenz, etravirina, nevirapina.
- Estatinas.

- Protectores gástricos: omeprazol.
- Ciclosporina, tacrolimus.
- Anticoagulantes orales.
- Anticonceptivos orales.
- Otros: Modafinilo, bosentán, digoxina.
- Hierba de San Juan (hipérico).

### ¿Qué efectos adversos puedo tener?

Los efectos adversos más frecuentes, que nosignifica que aparezcan en todos los pacientes son:

- Cansancio intenso, fatiga, sensación de debilidad o falta de energía.
- Cefalea.
- Náuseas, diarrea.

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

### **Avise rápidamente a su MÉDICO si tiene:**

- Una reacción alérgica grave (enrojecimiento de la piel, dificultad para respirar...)
- En caso de sobredosis

### ¿Cómo debo conservar MAVIRET®?

- Mantenga la medicación en su envase original a temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz.
- Mantenga la medicación fuera del alcance de los niños.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.

#### CONTACTO

- Solicitud de citas: 876 76 42 39 (9:00 a 11:00)
- Teléfono para consultas o dudas: 976 76 95 69 (9:00 a 15:00)
- Email: [farmaciapexternos@salud.aragon.es](mailto:farmaciapexternos@salud.aragon.es)
- Horario: Lunes a Viernes: 9:00 – 15:00 h.  
Martes y Jueves: 15:30 a 19:00h con cita previa