

## OFEV®

### NINTEDANIB



#### ¿Qué es OFEV® (NINTEDANIB)?

Es un medicamento indicado para el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática.

#### ¿Qué dosis debo tomar?

Deberá tomar **UNA** cápsula de 150 mg **dos veces al día**

Horario																							
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24					

#### ¿Cómo tomar OFEV® (NINTEDANIB)?

Debe tomar la dosis indicada **con alimentos**, procurando que sea siempre a las mismas horas.

Las cápsulas se deben tragar enteras con un vaso de agua, no se debe triturar, dividir, disolver, chupar ni masticar la cápsula o el contenido de la misma.

#### ¿Qué hago si olvido una dosis?

Si han pasado menos de 6 horas desde la hora prevista de la toma, tómelo en ese momento y después continúe su tratamiento de forma habitual. Si han pasado más de 6 horas, no tome la dosis olvidada y tome el medicamento a la dosis programada a la hora habitual.

**Nunca tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.**

#### ¿Cuándo no debo tomar OFEV® (NINTEDANIB)?

- Si tiene alergia a NINDETANIB o a alguno de los excipientes (aceite de soja). Si es alérgico a la soja o a los cacahuetes.
- Si está embarazada o cree que pudiera estarlo, y durante la lactancia.

#### Precauciones

- Si ha padecido episodios trombóticos arteriales como infarto o ictus.
- Si tiene o ha tenido problemas de sangrados.
- Si padece enfermedad hepática o renal.
- Si toma fármacos con efecto anticoagulante.
- Si padece hipertensión arterial.
- Debe utilizar medidas anticonceptivas eficaces mientras esté en tratamiento y hasta 3 meses después de la finalización del mismo. Los vómitos y/o la diarrea pueden reducir la eficacia de los métodos anticonceptivos hormonales orales, consulte con su médico el método anticonceptivo alternativo más apropiado.

## Interacciones

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación, productos naturales, multivitamínicos y/o plantas medicinales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con NINTEDANIB son:

- Ketoconazol, un medicamento para tratar las infecciones por hongos.
- Eritromicina y rifampicina, antibióticos utilizados para tratar infecciones bacterianas.
- Antiepilépticos como carbamacepina, fenobarbital y fenitoína
- Evite tomar Hierba de San Juan (Hipérico) y zumo de pomelo.

## ¿Qué efectos adversos puedo tener?

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro **que crea que puede estar relacionado con la medicación.**

- **Diarrea, náuseas, dolor abdominal.**
- **Alteraciones hepáticas.**
- Vómitos, pérdida de apetito.
- Dolor de cabeza.
- Sangrado.
- Erupción.

## Avise rápidamente a su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave, enrojecimiento de la piel, hinchazón de boca o lengua, dificultad para respirar...
- Coloración amarillenta de la piel o el blanco de los ojos, orina turbia de color oscuro, menos apetito del habitual, cansancio, náuseas y/o vómitos.
- Dolor intenso en el estómago, sangre en las heces.
- Sangre en la orina.
- Hematomas importantes, hemorragia, fiebre, cansancio y confusión.
- Dolor, hinchazón, enrojecimiento y calor en una extremidad.
- Dolor o presión en el pecho, dificultad para respirar y sensación de malestar.

## ¿Cómo debo conservar OFEV® (NINTEDANIB)?

- Mantenga la medicación en su envase original a temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

### CONTACTO

- Solicitud de citas: 876 76 42 39 (9:00 a 11:00)
- Teléfono para consultas o dudas: 976 76 95 69 (9:00 a 15:00)
- Email: [farmaciapexternos@salud.aragon.es](mailto:farmaciapexternos@salud.aragon.es)
- Horario: Lunes a Viernes: 9:00 – 15:00 h.  
Martes y Jueves: 15:30 a 19:00h con cita previa