

## ODEFSEY®

### EMTRICITABINA/RILPIVIRINA/TENOFOVIR 200/25/25 MG



#### ¿Qué es ODEFSEY®?

Es un medicamento que se utiliza para tratar la infección producida por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Este medicamento no cura la infección por VIH, pero retarda la progresión de la enfermedad, reduce la cantidad de virus de su cuerpo, mejorando el sistema inmunitario y disminuyendo el riesgo de enfermedades asociadas a la infección por VIH, por eso, aunque se encuentre mejor, no deje de tomarlo.

El éxito del tratamiento depende de su correcto cumplimiento.

#### ¿Qué dosis debo tomar?

Deberá tomar 1 comprimido de ODEFSEY® una vez al día.

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

#### ¿Cómo tomar ODEFSEY®?

Deberá tomar la dosis indicada **con alimentos** una vez al día, procurando que sea siempre a las mismas horas.

El comprimido se debe tragar entero, no fraccione, triture ni mastique los comprimidos.

#### ¿Qué hago si olvido una dosis?

Si han pasado menos de 12 horas desde la hora prevista de la toma, tómelo en ese momento y después continúe su tratamiento de forma habitual. Si han pasado más de 12 horas, no tome la dosis olvidada y tome el medicamento a la dosis programada a la hora habitual.

**En caso de vómito** antes de cuatro horas tras haber tomado su dosis, tome otro comprimido. Si han pasado más de cuatro horas no es necesario tomar otro comprimido.

**No interrumpa el tratamiento sin hablar con el médico**

#### ¿Cuándo no debo tomar ODEFSEY®?

- Si es alérgico a EMTRICITABINA, TENOFOVIR ALAFENAMIDA, RILPIVIRINA o alguno de sus excipientes (lactosa)
- Embarazo y lactancia.

#### Precauciones

- Utilizar medidas anticonceptivas.
- Conducción, uso de maquinaria. ODEFSEY® puede hacer que se sienta mareado y puede tener otros efectos que reduzcan su atención, no conduzca si tiene algún efecto de este tipo.

## Interacciones

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación, productos naturales, multivitamínicos y/o plantas medicinales que tome. Consulte con su médico o farmacéutico si comienza a tomar cualquier medicamento o producto farmacéutico o natural.

Algunos de los medicamentos que producen interacciones con ODEFSEY® son:

- Medicamentos antiepilépticos como **carbamazepina, oxcarbazepina, fenobarbital y fenitoína.**
- Antibióticos para tratar la tuberculosis como **rifampicina, rifabutina, rifapentina.**
- Medicamentos para tratar problemas de estómago como **omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol.**
- Dexametasona
- Antiácidos, suplementos o multivitamínicos que contengan aluminio y/o magnesio, se deben **tomar 2 horas antes o 4 horas después.**
- No tome Hierba de San Juan (Hipérico).

## ¿Qué efectos adversos puedo tener?

- **Dolor de cabeza**
- **Mareo**
- **Náuseas**
- **Dificultad para dormir**
- **Alteraciones analíticas, como aumento de los niveles de colesterol.**
- Disminución del apetito
- Somnolencia
- Depresión
- Dolor abdominal, diarrea, vómitos
- Erupción cutánea

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

## **Avisé rápidamente a su médico si tiene:**

- Una reacción cutánea grave, erupción acompañada de fiebre, hinchazón de la cara, boca o garganta, fiebre, fatiga, dolor muscular o articular.
- Signos o síntomas graves de infección o inflamación.
- Síntomas de depresión graves, pensamientos o comportamientos inusuales.

## ¿Cómo debo conservar ODEFSEY®?

- Mantenga la medicación en su envase original a temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

### CONTACTO

- Solicitud de citas: 876 76 42 39 (9:00 a 11:00)
- Teléfono para consultas o dudas: 976 76 95 69 (9:00 a 15:00)
- Email: [farmaciapexternos@salud.aragon.es](mailto:farmaciapexternos@salud.aragon.es)
- Horario: Lunes a Viernes: 9:00 – 15:00 h.  
Martes y Jueves: 15:30 a 19:00h con cita previa