

## ZEPOSIA® OZANIMOD



### ¿Qué es ZEPOSIA® (OZANIMOD)?

Es un medicamento indicado para el tratamiento de pacientes adultos con esclerosis múltiple remitente-recurrente (EMRR) con enfermedad activa y para pacientes con colitis ulcerosa.

### ¿Qué dosis debo tomar?

Se requiere una pauta posológica inicial de aumento escalonado de la dosis.

Días 1 a 4	<b>1 cápsula de 0,23 mg una vez al día</b>
Días 5 a 7	<b>1 cápsula de 0,46 mg una vez al día</b>
Días 8 y posteriores	<b>1 cápsula de 0,92 mg una vez al día</b>

**No debe interrumpir el tratamiento** durante el escalado de dosis (**primeros 14 días**), de lo contrario debería empezar con el escalado de dosis de nuevo.

**No interrumpa el tratamiento sin hablar con su médico.**

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

### ¿Cómo tomar ZEPOSIA® (OZANIMOD)?

Deberá tomar la dosis indicada **con o sin** alimentos, procurando que sea siempre a las mismas horas. Las cápsulas se deben tragar enteras con un vaso de agua.

### ¿Qué hago si olvido una dosis?

Si olvida una dosis de ZEPOSIA®, tómela en cuanto se acuerde. Sin embargo, si se olvida la dosis durante un día entero, sátese la dosis olvidada y tome la siguiente dosis a la hora habitual.

**No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.**

### ¿Cuándo no debo tomar ZEPOSIA® (OZANIMOD)?

- Si tiene alergia a OZANIMOD o a alguno de los excipientes.
- Durante el embarazo o lactancia.
- Si tiene una infección activa grave o infección activa crónica.
- Si tiene un proceso de cáncer activo.
- Si padece una insuficiencia hepática grave.
- Si en los últimos 6 meses ha tenido un infarto o un ictus

### Precauciones

- Debe utilizar métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento y durante 3 meses tras la suspensión del mismo. Se debe disponer de una prueba de embarazo negativa, antes de comenzar el tratamiento.
- Evite las vacunas vivas atenuadas durante el tratamiento y hasta 3 meses después de haberlo suspendido.
- Debe protegerse de la exposición al sol y los rayos UV.
- Si ha tenido problemas cardiacos, problemas hepáticos, infecciones como tuberculosis o cáncer debe comentárselo a su médico.

## Interacciones

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación, productos naturales, multivitamínicos y/o plantas medicinales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con OZANIMOD son:

- Rifampicina para tratar infecciones como la tuberculosis.
- Medicamentos para disminuir el colesterol como gemfibrozilo
- Medicamentos para tratar la depresión como fenelzina, duloxetina, fluoxetina, paroxetina o la enfermedad de Parkinson como selegilina
- Medicamentos que disminuyen la frecuencia cardíaca como betabloqueantes y antagonistas del calcio.
- Medicamentos para tratar la colitis ulcerosa como Azatioprina y 6-mercaptopurina.
- Clopidogrel.
- Ciclosporina.

## ¿Qué efectos adversos puedo tener?

- **Infecciones del tracto respiratorio superior, como nasofaringitis** resfriado, sinusitis.
- **Disminución de un tipo de glóbulos blancos llamados linfocitos.**
- Infecciones por herpes, infecciones del tracto urinario.
- Dolor de cabeza.
- Disminución del ritmo cardíaco.
- Edemas especialmente en tobillos y pies.
- Hipertensión.
- Enzimas hepáticas elevadas

## Avise rápidamente a su médico:

- Si presenta coloración amarillenta de la piel o el blanco de los ojos, orina de color oscuro, náuseas, vómitos y dolor en el lado derecho del abdomen.
- Si presenta síntomas como alteraciones de la visión, debilidad progresiva, torpeza, pérdida de memoria o confusión.
- Si presenta síntomas repentinos como dolor de cabeza intenso, confusión, convulsiones y pérdida de visión.
- Si presenta síntomas de infección.

## ¿Cómo debo conservar ZEPOSIA® (OZANIMOD)?

- Mantenga la medicación en su envase original a temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

### CONTACTO

- Solicitud de citas: 876 76 42 39 (9:00 a 11:00)
- Teléfono para consultas o dudas: 976 76 95 69 (9:00 a 15:00)
- Email: [farmaciapexternos@salud.aragon.es](mailto:farmaciapexternos@salud.aragon.es)
- Horario: Lunes a Viernes: 9:00 – 15:00 h.  
Martes y Jueves: 15:30 a 19:00h con cita previa