

EMTRICITABINA/TENOFOVIR 200/245 MG

¿Qué es EMTRICITABINA/TENOFOVIR?

Son unos antivirales utilizados para la profilaxis y tratamiento de la infección producida por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

¿Qué dosis debo tomar?

Deberá tomar 1 comprimido de EMTRICITABINA/TENOFOVIR una vez al día.

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

¿Cómo tomar EMTRICITABINA/TENOFOVIR?

Deberá tomar la dosis indicada **con alimentos** una vez al día, procurando que sea siempre a las mismas horas.

El comprimido se debe tragar entero, no fraccione, triture ni mastique los comprimidos. Si tiene dificultad para tragar, puede deshacer el comprimido en aproximadamente 100 ml de agua, zumo de naranja o zumo de uva y tomarlo inmediatamente.

¿Qué hago si olvido una dosis?

- Si han pasado menos de 12 horas desde la hora prevista de la toma, tómelo en ese momento junto con algún alimento, y después continúe su tratamiento de forma habitual. Si han pasado más de 12 horas, no tome la dosis olvidada y tome el medicamento a la dosis programada a la hora habitual.
- En **caso de vómito** antes de una hora después de haber tomado su dosis, tome otro comprimido. Si ha pasado más de una hora, no es necesario tomar otro comprimido.
- **No interrumpa su tratamiento sin hablar con el médico.**

¿Cuándo no debo tomar EMTRICITABINA/TENOFOVIR?

- Si es alérgico a EMTRICITABINA O TENOFOVIR o alguno de sus excipientes (almidón de maíz, lactosa).
- Embarazo y lactancia.

Precauciones

- Debe emplear medidas anticonceptivas.
- Pacientes con enfermedad renal
- Conducción, uso de maquinaria. EMTRICITABINA/TENOFOVIR puede hacer que se sienta mareado y puede tener otros efectos que reduzcan su atención, no conduzca si tiene algún efecto de este tipo.

Interacciones

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación, productos naturales, multivitamínicos y/o plantas medicinales que tome. Consulte con su médico o

farmacéutico si comienza a tomar cualquier medicamento o producto farmacéutico o natural.

Es especialmente importante que informe a su médico o farmacéutico si está tomando medicamentos que pueden producir daño renal como antiinflamatorios (ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco...) utilizados para el tratamiento del dolor o la inflamación.

- Verapamilo

¿Qué efectos adversos puedo tener?

- **Diarrea, náuseas, vómitos**
- **Dolor de cabeza, mareos**
- **Pérdida de apetito**
- **Cansancio, debilidad**
- **Alteraciones analíticas**
- Dolor abdominal, gases
- Insomnio, sueños anormales
- Erupción, picor

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

Avisé rápidamente a su médico si tiene:

Signos de infección o inflamación como fiebre dolor de cabeza, erupción cutánea, dolor de garganta o tos, cansancio excesivo, malestar general o dificultad para respirar.

¿Cómo debo conservar EMTRICITABINA/TENOFOVIR?

- Mantenga la medicación en su envase original a temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños

CONTACTO

- Solicitud de citas: 876 76 42 39 (9:00 a 11:00)
- Teléfono para consultas o dudas: 976 76 95 69 (9:00 a 15:00)
- Email: farmaciapexternos@salud.aragon.es
- Horario: Lunes a Viernes: 9:00 – 15:00 h.
Martes y Jueves: 15:30 a 19:00h con cita previa