

## REZOLSTA® DARUNAVIR/COBICISTAT 800/150MG



### ¿Qué es REZOLSTA®?

Es un medicamento que se utiliza para tratar la infección producida por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Este medicamento no cura la infección por VIH, reduce la cantidad de virus de su cuerpo, mejorando el sistema inmunitario y disminuyendo el riesgo de infecciones asociadas a la infección por el VIH, aunque se encuentre mejor, no deje de tomarlo.

REZOLSTA® se utiliza en combinación con otros medicamentos contra el VIH.

El éxito del tratamiento depende de su correcto cumplimiento.

### ¿Qué dosis debo tomar?

Deberá tomar 1 comprimido de REZOLSTA® una vez al día.

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

### ¿Cómo tomar REZOLSTA®?

Deberá tomar la dosis indicada, **con alimentos** una vez al día, procurando que sea siempre a las mismas horas.

El comprimido se debe tragar entero, no fraccione, triture ni mastique los comprimidos. Si tiene dificultades para tragar REZOLSTA®, puede partir el comprimido e inmediatamente después de partirlo debe tomar la dosis entera (ambas dos mitades).

### ¿Qué hago si olvido una dosis?

Si han pasado menos de 12 horas desde la hora prevista de la toma, tómelo en ese momento y después continúe su tratamiento de forma habitual. Si han pasado más de 12 horas, no tome la dosis olvidada y tome el medicamento a la dosis programada a la hora habitual.

**Si vomita** antes de que pasen 4 horas tras haber tomado el medicamento, tome otro comprimido con una comida. Si han pasado más de cuatro horas no es necesario tomar otro comprimido.

**No interrumpa el tratamiento sin consultar con el médico.**

### ¿Cuándo no debo tomar REZOLSTA®?

- Si es alérgico a DARUNAVIR, COBICISTAT o alguno de sus excipientes (celulosa)
- Embarazo y lactancia.

### Precauciones

- Debe utilizar medidas anticonceptivas
- Conducción y uso de maquinaria, REZOLSTA® puede hacer que se sienta mareado y puede tener otros efectos que reduzcan su atención, no conduzca si tiene algún efecto de este tipo.

## Interacciones

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación, productos naturales, multivitamínicos y/o plantas medicinales que tome. Consulte con su médico o farmacéutico si comienza a tomar cualquier medicamento o producto farmacéutico o natural.

Numerosos medicamentos pueden interferir con el efecto de REZOLSTA® y se pueden producir efectos adversos indeseados o disminuir la efectividad del tratamiento, entre ellos se encuentran:

### Medicamentos antiepilépticos

- Algunos antibióticos para tratar infecciones bacterianas y medicamentos indicados para tratar infecciones por hongos.
- Medicamentos para tratar problemas de corazón, la disfunción eréctil o la presión arterial elevada en la circulación pulmonar.
- Opiáceos utilizados en el tratamiento del dolor, determinados medicamentos psiquiátricos y algunos utilizados para tratar la depresión y la ansiedad.
- Medicamentos anticoagulantes,
- Metformina para tratar la diabetes,
- Colchicina para tratar la gota, algunos medicamentos utilizados para disminuir los niveles de colesterol, corticoides y anticonceptivos hormonales basados en estrógenos, entre otros.
- No tome Hierba de San Juan (Hipérico).
- Evite tomar zumo de pomelo.

## ¿Qué efectos adversos puedo tener?

- **Dolor de cabeza**
- **Diarrea**
- **Náuseas**
- **Erupción en la piel**
- Cansancio y debilidad
- Trastornos del sueño
- Dolor abdominal, vómitos, gases
- Pérdida de apetito
- Picor
- Dolores musculares
- Aumento de los niveles de colesterol, triglicéridos y/o creatinina

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

## **Avise rápidamente a su médico si tiene:**

- Dolor o rigidez en las articulaciones, debilidad o dificultades para moverse
- Síntomas de inflamación o infección y fiebre
- Erupciones graves en la piel, erupciones acompañadas de fiebre, malestar general, cansancio o dolor muscular y/o articular.

## ¿Cómo debo conservar REZOLSTA®?

- Mantenga la medicación en su envase original a temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

### CONTACTO

- Solicitud de citas: 876 76 42 39 (9:00 a 11:00)
- Teléfono para consultas o dudas: 976 76 95 69 (9:00 a 15:00)
- Email: [farmaciapexternos@salud.aragon.es](mailto:farmaciapexternos@salud.aragon.es)
- Horario: Lunes a Viernes: 9:00 – 15:00 h.  
Martes y Jueves: 15:30 a 19:00h con cita previa

F-46\_Z2 (E)  
M\_SF  
Rev. B

Fecha revisión: agosto de 2024