

## MAYZENT® SIPONIMOD



### ¿Qué es MAYZENT® (SIPONIMOD)?

Es un medicamento indicado para el tratamiento de pacientes adultos con esclerosis múltiple secundaria progresiva.

### ¿Qué dosis debo tomar?

Se requiere una pauta posológica inicial de aumento escalonado de la dosis durante 5 días, hasta alcanzar la dosis de mantenimiento.

Días 1 y 2	<b>1 comprimido de 0,25 mg una vez al día</b>
Día 3	<b>2 comprimidos de 0,25 mg una vez al día</b>
Día 4	<b>3 comprimidos de 0,25 mg una vez al día</b>
Día 5	<b>5 comprimidos de 0,25 mg una vez al día</b>
Dosis de mantenimiento	<b>1 comprimido de 1 o 2 mg una vez al día según su metabolismo</b>

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

### ¿Cómo tomar MAYZENT® (SIPONIMOD)?

Deberá tomar la dosis indicada **con o sin** alimentos, procurando que sea siempre a las mismas horas. Los comprimidos se deben tragar enteros con un vaso de agua.

### ¿Qué hago si olvido una dosis?

**Si olvida una dosis** de MAYZENT® en los 6 primeros días, debe volver al día 1 de la dosis de inicio (0,25mg).

Si la **dosis olvidada** es **después de los 6 días** debe tomársela al día siguiente.

**No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.**

Si **olvida 4 dosis o más** consulte con su médico o farmacéutico.

**No interrumpa el tratamiento sin hablar con su médico.**

### ¿Cuándo no debo tomar MAYZENT® (SIPONIMOD)?

- Si tiene alergia a SIPONIMOD o a alguno de los excipientes (aceite de soja, lactosa) o al cacahuete.
- Durante el embarazo o lactancia.
- Si tiene antecedentes de leucoencefalopatía multifocal progresiva o meningitis criptocócica.
- Procesos cancerígenos activos.
- Si padece insuficiencia hepática grave.
- Si ha tenido problemas cardiovasculares en los 6 meses anteriores.
- Si tiene antecedentes de bloqueo cardíaco.
- Si tiene síndrome de inmunodeficiencia.

### Precauciones

- Debe utilizar métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento y hasta 10 días después de la última dosis. Se debe disponer de una prueba de embarazo negativa, antes de comenzar el tratamiento.
- Evite las vacunas vivas atenuadas durante el tratamiento y hasta 4 semanas después de haberlo suspendido.
- Debe protegerse de la exposición al sol y los rayos UV.
- Debe vacunarse contra la varicela si no presenta anticuerpos.

## Interacciones

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación, productos naturales, multivitamínicos y/o plantas medicinales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con SIPONIMOD son:

- Medicamentos antiarrítmicos como quinidina, procainamida, amiodarona o sotalol.
- Betabloqueantes: atenolol, propanolol.
- Fármacos que disminuyen la frecuencia cardiaca como diltiazem, verapamil, digoxina, ivabradina.
- Fluconazol para tratar infecciones por hongos.
- Medicamentos que afectan al sistema inmunitario como la quimioterapia o medicamentos inmunosupresores.
- Carbamazepina
- Modafinilo

## ¿Qué efectos adversos puedo tener?

- **Dolor de cabeza**, mareo, temblor
- **Hipertensión.**
- **Enzimas hepáticas elevadas**
- **Infección por herpes zoster**
- Náuseas, diarrea
- Edemas
- Cansancio
- Bradicardia
- Alteraciones visuales
- Disminución de glóbulos blancos.

## Avisé rápidamente a su médico:

- Si presenta coloración amarillenta de la piel o el blanco de los ojos, orina de color oscuro, náuseas, vómitos y dolor en el lado derecho del abdomen.
- Si presenta síntomas como alteraciones de la visión, debilidad progresiva, torpeza, pérdida de memoria o confusión.
- Si presenta síntomas repentinos como dolor de cabeza intenso, confusión, convulsiones y pérdida de visión.
- Si presenta síntomas de infección.

## ¿Cómo debo conservar MAYZENT® (SIPONIMOD)?

- Mantenga la medicación en su envase original a temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

### CONTACTO

- Solicitud de citas: 876 76 42 39 (9:00 a 11:00)
- Teléfono para consultas o dudas: 976 76 95 69 (9:00 a 15:00)
- Email: [farmaciapexternos@salud.aragon.es](mailto:farmaciapexternos@salud.aragon.es)
- Horario: Lunes a Viernes: 9:00 – 15:00 h.  
Martes y Jueves: 15:30 a 19:00h con cita previa