

SYMTUZA® DARUNAVIR/COBICISTAT/EMTRICITABINA/TENOFOVIR 800/150/200/10 MG



¿Qué es SYMTUZA®?

Es un medicamento que se utiliza para tratar la infección producida por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Este medicamento no cura de la infección por VIH, reduce la cantidad de virus de su cuerpo, mejorando el sistema inmunitario y disminuyendo el riesgo de infecciones asociadas a la infección por el VIH, por eso, aunque se encuentre mejor, no deje de tomarlo.

El éxito del tratamiento depende de su correcto cumplimiento

¿Qué dosis debo tomar?

Deberá tomar 1 comprimido una vez al día.

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

¿Cómo tomar SYMTUZA®?

Deberá tomar la dosis indicada **CON** alimentos una vez al día, procurando que sea siempre a las mismas horas.

El comprimido se debe tragar entero, no fraccione, triture ni mastique los comprimidos.

¿Qué hago si olvido una dosis?

Si han pasado menos de 12 horas desde la hora prevista de la toma, tómelo en ese momento y después continúe su tratamiento de forma habitual. Si han pasado más de 12 horas, no tome la dosis olvidada y tome el medicamento a la dosis programada a la hora habitual.

En caso de vómito antes de una hora tras haber tomado su dosis, tome otro comprimido. Si ha pasado más de una hora no es necesario tomar otro comprimido.

No interrumpa el tratamiento sin hablar con el médico.

¿Cuándo no debo tomar SYMTUZA®?

- Si es alérgico a DARUNAVIR, COBICISTAT, EMTRICITABINA, TENOFOVIR o alguno de sus excipientes
- Embarazo y lactancia.

Precauciones

- Debe utilizar medidas anticonceptivas.
- Conducción, uso de maquinaria, SYMTUZA® puede hacer que se sienta mareado y puede tener otros efectos que reduzcan su atención, no conduzca si tiene algún efecto de este tipo.

Interacciones

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación, productos naturales, multivitamínicos y/o plantas medicinales que tome. Consulte con su médico o farmacéutico si comienza a tomar cualquier medicamento o producto farmacéutico o natural.

Numerosos medicamentos pueden interferir con el efecto de SYMTUZA® y se pueden producir efectos adversos indeseados o disminuir la efectividad del tratamiento, entre ellos se encuentran:

- Medicamentos antiepilépticos.
- Algunos antibióticos para tratar infecciones bacterianas y medicamentos indicados para tratar infecciones por hongos.
- Medicamentos para tratar problemas de corazón, la disfunción eréctil o la presión arterial elevada en la circulación pulmonar.
- Opiáceos utilizados en el tratamiento del dolor.
- Determinados medicamentos psiquiátricos y algunos utilizados para tratar la depresión y la ansiedad.
- Medicamentos anticoagulantes, metformina para tratar la diabetes, colchicina para tratar la gota, algunos medicamentos utilizados para disminuir los niveles de colesterol, corticoides y anticonceptivos hormonales basados en estrógenos entre otros.
- No tome Hierba de San Juan (Hipérico)
- Evite tomar zumo de pomelo

¿Qué efectos adversos puedo tener?

- **Dolor de cabeza**
- **Diarrea**
- **Erupción cutánea**
- Dolor abdominal, náuseas, vómitos, gases, disminución del apetito
- Cansancio, debilidad
- Trastornos del sueño
- Mareo
- Anemia
- Dolor muscular o de las articulaciones
- Aumento de los niveles de creatinina sérica

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

Avisé rápidamente a su médico si tiene:

- Náuseas o vómitos frecuentes, dolor abdominal, pérdida del apetito, respiración rápida y/o profunda, somnolencia, debilidad muscular o malestar general.
- Síntomas de infección, inflamación y fiebre.
- Debilidad muscular, palpitaciones, temblores o hiperactividad.
- Erupciones en la piel, especialmente si se acompañan de fiebre, malestar general, cansancio o debilidad y/o dolor osteomuscular

¿Cómo debo conservar SYMTUZA®?

- Mantenga la medicación en su envase original a temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

CONTACTO

- Solicitud de citas: 876 76 42 39 (9:00 a 11:00)
- Teléfono para consultas o dudas: 976 76 95 69 (9:00 a 15:00)
- Email: farmaciapexternos@salud.aragon.es
- Horario: Lunes a Viernes: 9:00 – 15:00 h.
Martes y Jueves: 15:30 a 19:00h con cita previa