

## TIVICAY®

### DOLUTEGRAVIR 50 MG



#### ¿Qué es TIVICAY®?

Es un medicamento que se utiliza para tratar la infección producida por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Este medicamento no cura la infección por VIH, reduce la cantidad de virus de su cuerpo, mejorando el sistema inmunitario y disminuyendo el riesgo de infecciones asociadas a la infección por el VIH, por eso, aunque se encuentre mejor, no deje de tomarlo.

TIVICAY® siempre se utiliza en combinación con otros medicamentos contra el VIH.

El éxito del tratamiento depende de su correcto cumplimiento.

#### ¿Qué dosis debo tomar?

Deberá tomar 1 comprimido de 50 mg una vez al día.

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

#### ¿Cómo tomar TIVICAY®?

Deberá tomar la dosis indicada con o sin alimentos una vez al día, procurando que sea siempre a las mismas horas.

El comprimido se debe tragar entero, no fraccione, triture ni mastique los comprimidos.

#### ¿Qué hago si olvido una dosis?

Si han pasado menos de 20 horas desde la hora prevista de la toma, tómelo en ese momento y después continúe su tratamiento de forma habitual. Si han pasado más de 20 horas, no tome la dosis olvidada y tome el medicamento a la dosis programada a la hora habitual.

**En caso de vómito antes de una hora** tras haber tomado su dosis, tome otro comprimido. Si ha pasado más de una hora no es necesario tomar otro comprimido.

**No interrumpa el tratamiento sin hablar con el médico.**

#### ¿Cuándo no debo tomar TIVICAY®?

- Si es alérgico a DOLUTEGRAVIR o alguno de sus excipientes (Almidón de patata)
- Lactancia.
- Si está tomando un medicamento llamado fampridina

## Precauciones

- Conducción, uso de maquinaria, TIVICAY® puede hacer que se sienta mareado y puede tener otros efectos que reduzcan su atención, no conduzca si tiene algún efecto de este tipo.

## Interacciones

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación, productos naturales, multivitamínicos y/o plantas medicinales que tome, o comience a tomar una vez iniciado el tratamiento, ya que algunos pueden interferir con el uso de TIVICAY®.

Algunos de los medicamentos que producen interacciones con DOLUTEGRAVIR son:

- Rifampicina para tratar infecciones como la tuberculosis
- Metformina para tratar la diabetes
- Medicamentos antiepilépticos como fenitoína, fenobarbital y carbamazepina.
- No tome Hierba de San Juan (Hipérico).
- Medicamentos antiácidos, suplementos de calcio y de hierro y multivitamínicos con minerales deben tomarse 6 horas antes de tomar Dolutegravir o dos horas después de tomarlo.

## ¿Qué efectos adversos puedo tener?

- **Dolor de cabeza**
- **Náuseas**
- **Diarrea**
- Alteraciones del sueño
- Depresión, ansiedad
- Mareo
- Dolor abdominal, vómitos, gases
- Erupción, picor
- Cansancio

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

## **Avisé rápidamente a su médico si tiene:**

- Signos de infección o inflamación como fiebre, dolor de cabeza, dificultad para respirar.
- Dolor articular, rigidez.
- Palpitaciones, temblor, hiperactividad y/o debilidad muscular.
- Depresión, pensamientos o comportamientos inusuales.

## ¿Cómo debo conservar DOLUTEGRAVIR?

- Mantenga la medicación en su envase original a temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

### CONTACTO

- Solicitud de citas: 876 76 42 39 (9:00 a 11:00)
- Teléfono para consultas o dudas: 976 76 95 69 (9:00 a 15:00)
- Email: [farmaciapexternos@salud.aragon.es](mailto:farmaciapexternos@salud.aragon.es)
- Horario: Lunes a Viernes: 9:00 – 15:00 h.  
Martes y Jueves: 15:30 a 19:00h con cita previa