

ADTRALZA® TRALOKINUMAB



¿Qué es TRALOKINUMAB?

ADTRALZA® Tralokinumab es un anticuerpo monoclonal humano, utilizado para el tratamiento de dermatitis atópica de moderada a grave en pacientes adultos y adolescentes a partir de los 12 años de edad.

¿Qué dosis debo tomar?

Se debe administrar mediante inyección subcutánea una dosis inicial de 600 mg (cuatro inyecciones de 150 mg), seguida de 300 mg (dos inyecciones de 150 mg) administrados cada dos semanas.

A criterio del médico, puede considerarse una pauta cada cuatro semanas.

¿Cómo tomar TRALOKINUMAB?

La inyección se puede administrar en abdomen o muslos. Si alguna otra persona administra la inyección, también se puede en la parte superior del brazo.

Debe alternar los lugares de inyección y no administrarse en zonas donde la piel sea sensible, esté dañada, enrojecida o endurecida.

Para evitar molestias en el lugar de inyección, mantener la pluma a temperatura ambiente durante al menos 30 minutos antes de la inyección.

¿Qué hago si olvido una dosis?

Si olvidó una dosis de Tralokinumab (ADTRALZA®), debe administrarla lo antes posible tras darse cuenta de ello.

Después póngase en contacto con su médico, quien le dirá cuándo se debe administrar la dosis siguiente.

¿Cuándo no debo tomar TRALOKINUMAB?

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

Precauciones

- Si es alérgico a tralokinumab o alguno de sus excipientes
- Embarazo y lactancia
- Si presenta conjuntivitis
- Si le van a vacunar con vacunas vivas atenuados

Interacciones

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. En principio no hay descritas interacciones con otros medicamentos.

¿Qué efectos adversos puedo tener?

Los efectos adversos frecuentes (no significa que aparezcan en todos los pacientes), son:

- Conjuntivitis
- Reacciones alérgicas tales como erupción, hinchazón o urticaria.
- Reacciones en el lugar de inyección (eritema, dolor, hematomas)
- infecciones del tracto respiratorio superior (resfriado común)

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

Avisé rápidamente a su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave: enrojecimiento de la piel, dificultad para respirar...

¿Cómo debo conservar ADTRALZA®?

- En **nevera** (entre 2°C y 8°C). No congelar.
- Debe conservar la pluma precargada en el envase original para protegerla de la luz.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.

CONTACTO

- Solicitud de citas: 876 76 42 39 (9:00 a 11:00)
- Teléfono para consultas o dudas: 976 76 95 69 (9:00 a 15:00)
- Email: farmaciapexternos@salud.aragon.es
- Horario: Lunes a Viernes: 9:00 – 15:00 h.
Martes y Jueves: 15:30 a 19:00h con cita previa