

## **TRIUMEQ®** **DOLUTEGRAVIR/ABACAVIR/LAMIVUDINA 50/600/300 MG**



### ¿Qué es TRIUMEQ®?

Es un medicamento que se utiliza para tratar la infección producida por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Este medicamento no cura la infección por VIH, reduce la cantidad de virus de su cuerpo, mejorando el sistema inmunitario y disminuyendo el riesgo de infecciones asociadas a la infección por el VIH, por eso, aunque se encuentre mejor, no deje de tomarlo.

El éxito del tratamiento depende de su correcto cumplimiento.

### ¿Qué dosis debo tomar?

Deberá tomar 1 comprimido una vez al día.

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

### ¿Cómo tomar TRIUMEQ®?

Deberá tomar la dosis indicada con o sin alimentos una vez al día, procurando que sea siempre a las mismas horas.

El comprimido se debe tragar entero, no fraccione, triture ni mastique los comprimidos.

### ¿Qué hago si olvido una dosis?

Si han pasado menos de 12 horas desde la hora prevista de la toma, tómelo en ese momento y después continúe su tratamiento de forma habitual. Si han pasado más de 12 horas, no tome la dosis olvidada y tome el medicamento a la dosis programada a la hora habitual.

**No interrumpa el tratamiento sin hablar con el médico.**

### ¿Cuándo no debo tomar TRIUMEQ®?

- Si es alérgico a DOLUTEGRAVIR, ABACAVIR, LAMIVUDINA o alguno de sus excipientes (manitol)
- Embarazo y lactancia.
- Si está tomando un medicamento llamado fampridina.

### Precauciones

- Medidas anticonceptivas
- Conducción y uso de maquinaria, TRIUMEQ® puede hacer que se sienta mareado y puede tener otros efectos que reduzcan su atención, no conduzca si tiene algún efecto de este tipo

## Interacciones

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación, productos naturales, multivitamínicos y/o plantas medicinales que tome, o comience a tomar una vez iniciado el tratamiento, ya que algunos pueden interferir con el uso de TRIUMEQ®. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con TRIUMEQ® son:

- Medicamentos para tratar la tuberculosis como rifampicina
- Metformina para el tratamiento de la diabetes
- Antiepilépticos como carbamacepina, oxcarbacepina fenobarbital y fenitoína.
- Antiácidos, suplementos de calcio, suplemento de hierro o preparados multivitamínicos que contengan calcio, hierro y/o magnesio, debe tomarlos **6 horas antes** de tomar Triumeq®, o **2 horas después** de tomarlo.
- No tome hierba de San Juan o Hipérico.
- Evite tomar zumo de pomelo.
- Evite tomar medicamentos u otros productos que contengan sorbitol.

## ¿Qué efectos adversos puedo tener?

- **Diarrea**
- **Náuseas**
- **Cansancio**
- **Insomnio**
- **Dolor de cabeza**
- Trastornos del sueño, pesadillas, depresión, ansiedad
- Mareo, somnolencia
- Dolor abdominal, flatulencia, vómitos, pérdida del apetito
- Erupción, picor, pérdida de cabello
- Tos, irritación nasal
- Dolores musculares y /o articulares

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

## **Avisé rápidamente a su médico si tiene:**

- Signos de infección o inflamación como fiebre, dolor de cabeza, dificultad para respirar.
- Dolor articular, rigidez.
- Palpitaciones, temblor, hiperactividad y/o debilidad muscular.
- Depresión, pensamientos o comportamientos inusuales.

## ¿Cómo debo conservar TRIUMEQ®?

- Mantenga la medicación en su envase original a temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

### CONTACTO

- Solicitud de citas: 876 76 42 39 (9:00 a 11:00)
- Teléfono para consultas o dudas: 976 76 95 69 (9:00 a 15:00)
- Email: [farmaciapexternos@salud.aragon.es](mailto:farmaciapexternos@salud.aragon.es)
- Horario: Lunes a Viernes: 9:00 – 15:00 h.  
Martes y Jueves: 15:30 a 19:00h con cita previa