

RINVOQ® UPADACITINIB



¿Qué dosis debo tomar?

RINVOQ® es un medicamento que contiene como principio activo Upadacitinib. La dosis recomendada es de 15 mg o 30 mg una vez al día.

Tome los comprimidos enteros por vía oral con un vaso de agua, a la misma hora todos los días. No se pueden fraccionar.

Se pueden tomar CON o SIN alimentos.

¿Qué hago si olvido una dosis?

Tómela tan pronto como se acuerde. Si olvida la dosis durante un día entero, salte la dosis olvidada y tome una sola dosis al día siguiente como lo hace normalmente.

No tome una dosis doble para compensar un comprimido olvidado.

¿Cuándo no debo tomar RINVOQ®?

- Si es alérgico al upadacitinib.
- Si tiene una infección grave (como neumonía o tuberculosis activa).
- Si tiene problemas hepáticos graves.
- Si está embarazada.

Precauciones

- Si es usted una mujer en edad fértil, debe utilizar un **método anticonceptivo eficaz** para evitar quedarse embarazada mientras esté tomando RINVOQ® y durante al menos 4 semanas después de la última dosis de RINVOQ®.
- Si se queda embarazada durante este tiempo, debe comunicárselo a su médico inmediatamente.

Preste especial atención si:

- Tiene herpes zóster o erupción cutánea dolorosa con ampollas (herpes zóster)

- Infección pulmonar (neumonía), que puede causar dificultad para respirar, fiebre, y tos con mucosidad.

Interacciones

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma:

- Medicamentos para tratar las infecciones por hongos (como itraconazol, posaconazol o voriconazol) y para tratar infecciones bacterianas (como claritromicina y rifampicina).
- Medicamentos para tratar el síndrome de Cushing (como ketoconazol).
- Medicamentos para tratar las convulsiones o crisis epilépticas (como fenitoína).
- Medicamentos que afectan a su sistema inmunitario (como azatioprina, ciclosporina y tacrolimus).

¿Qué efectos adversos puedo tener?

Los efectos adversos más frecuentes que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son:

- Infecciones de garganta y nariz
- Tos y fiebre
- Sensación de malestar en el estómago (náuseas)
- Alteración en los análisis (número bajo de glóbulos blancos en análisis de sangre y niveles altos de colesterol)
- Aumento de peso

¿Cómo debo conservar RINVOQ?

- Conservar en el frasco y/o blíster original para protegerlo de la humedad.

¿Cómo debo desechar los residuos?

- Los envases deberán desecharse en el Servicio de Farmacia del Hospital.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.

CONTACTO

- Solicitud de citas: 876 76 42 39 (9:00 a 11:00)
- Teléfono para consultas o dudas: 976 76 95 69 (9:00 a 15:00)
- Email: farmaciapexternos@salud.aragon.es
- Horario: Lunes a Viernes: 9:00 – 15:00 h.
Martes y Jueves: 15:30 a 19:00h con cita previa