

VOSEVI®

Sofosbuvir/Velpatasvir/Voxilaprevir



¿Qué es VOSEVI®?

Sofosbuvir + Velpatasvir + Voxilaprevir (Vosevi®) es una combinación de tres medicamentos antiviricos utilizados en adultos, para tratar la hepatitis C crónica.

¿Cómo se debe tomar?

- 1 comprimido UNA vez al día CON ALIMENTOS.
- Deben tragarse enteros con un vaso de agua sin disolverlos, ni masticar, ni chupar.

¿Qué hago si olvido una dosis?

- Si se ha olvidado de tomar una dosis, tómela lo antes posible y a continuación tome la siguiente dosis a su hora habitual. Si han transcurrido más de 18 horas espere a la siguiente toma.
- Si vomita en un plazo de 4 horas después de la toma de Vosevi®, debe tomar un comprimido adicional, si vomita pasadas estas 4 horas, no debe tomar ninguna dosis adicional.
- **No tome una dosis doble** para compensar un olvido.

¿Cuándo no debo tomar VOSEVI®?

- Si usted es alérgico a sofosbuvir o velpatasvir o voxilaprevir, así como a algunos de los componentes del comprimido (lactosa)
- Si está embarazada o en período de lactancia.

Precauciones

- Si se queda embarazada debe informar inmediatamente a su médico.

Interacciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma:

- Antibióticos rifampicina, rifabutina.
- Antiepilépticos: fenobarbital, fenitoina, carbamazepina, oxcarbacepina, eslicarbazepina.
- Antivirales: efavirenz, atazanavir, lopinavir.
- Estatinas
- Anticoagulantes orales
- Amiodarona
- Digoxina
- Anticonceptivos orales o anillos vaginales anticonceptivos
- Hierba de San Juan (hipérico).
- Inmunosupresores: ciclosporina.
- Antiácidos:
 - Se debe separar al menos 4 horas la toma de Vosevi® y antiácido (ej. Hidróxido de aluminio, de magnesio).
 - Se puede administrar simultáneamente con famotidina.
 - Se debe evitar la administración concomitante con omeprazol, pantoprazol... (en caso necesario, no superar la dosis equivalente a omeprazol 20 mg/día).

¿Qué efectos adversos puedo tener?

Los efectos adversos más frecuentes, que nosignifica que aparezcan en todos los pacientes son:

- Cefalea
- Náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, disminución del apetito.
- Erupción cutánea.
- Dolores musculares.

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

Avisé rápidamente a su MÉDICO si tiene:

- Una reacción alérgica grave (enrojecimiento de la piel, dificultad para respirar).
- En caso de sobredosis.

¿Cómo debo conservar VOSEVI®?

- Mantenga la medicación en su envase original a temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz.
- Mantenga la medicación fuera del alcance de los niños.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.

CONTACTO

- Solicitud de citas: 876 76 42 39 (9:00 a 11:00)
- Teléfono para consultas o dudas: 976 76 95 69 (9:00 a 15:00)
- Email: farmaciapexternos@salud.aragon.es
- Horario: Lunes a Viernes: 9:00 – 15:00 h.
Martes y Jueves: 15:30 a 19:00h con cita previa

F-46_Z2 (E)
M_SF
Rev. B

Fecha revisión: agosto de 2024