

OLUMIANT® BARICITINIB



¿Qué dosis debo tomar?

Deberá tomar 1 comprimido de 4 mg 1 vez al día.

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

¿Cómo tomar OLUMIANT®?

La dosis recomendada de OLUMIANT® es de 4 mg o 2 mg (en determinados casos) por vía oral una vez al día:

- Los comprimidos de OLUMIANT® se deben tragar **enteros con o sin alimentos**. No se deben cortar, triturar ni masticar los comprimidos.
- Tomen OLUMIANT® con una comida aproximadamente **a la misma hora todos los días**.

¿Qué hago si olvido una dosis?

- Tomar esa dosis lo antes posible a menos que falten menos de 8 horas para la siguiente dosis.
- Si han pasado más de 8 horas, no tome la dosis olvidada. A partir de entonces, el tratamiento se debe reanudar a la hora programada habitual.
- En caso de vómito, NO tome otra dosis ese día, y continúe su tratamiento con normalidad.

¿Cuándo no debo tomar OLUMIANT®?

- Si es alérgico a Baricitinib o alguno de sus excipientes.
- Infecciones graves activas
- Insuficiencia hepática grave
- Embarazo y lactancia.

Precauciones

- No se recomienda utilizar baricitinib en mujeres en edad fértil que no estén utilizando métodos anticonceptivos
- No tome OLUMIANT® si está embarazada o cree poder estarlo.

Interacciones

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación, productos naturales, multivitamínicos y/o plantas medicinales que tome.

- Antifúngicos: Fluconazol, Ketoconazol, Clotrimazol, Itraconazol y Voriconazol.
- No se recomienda el uso de medicamentos que depriman el sistema inmunitario incluyendo las terapias biológicas dirigidas (antiTNF e inmunosupresores como azatioprina, tacrólimus o ciclosporina).
- Otros medicamentos que pertenecen al grupo de los inhibidores de la Janus quinasa, como ruxolitinib.

Revise con su médico y/o farmacéutico las posibles interacciones entre su tratamiento habitual y OLUMIANT®.

¿Qué efectos adversos puedo tener?

Los efectos adversos más frecuentes que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son:

- Neumonía, Gripe, Faringitis, Bronquitis, Sinusitis, infección herpes simple (calenturas)
- Aumento de los niveles de lípidos (colesterol) en sangre.
- Dolor abdominal, Vómitos, Diarreas, Dolor abdominal, gastroenteritis
- Dolor de cabeza.
- Alteraciones analíticas.

Avisé rápidamente a su médico si tiene:

Consulte a su médico o farmacéutico antes y durante el tratamiento con Olumiant® si usted:

- Una reacción alérgica grave: enrojecimiento de la piel, dificultad para respirar...
- Dificultad para respirar, ansiedad, dolor en el pecho, sudor frío.
- Fiebre mayor a 38°C.

¿Cómo debo conservar OLUMIANT®?

- Mantenga la medicación en su envase original a temperatura ambiente, protegido de la luz.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.

CONTACTO

- Solicitud de citas: 876 76 42 39 (9:00 a 11:00)
- Teléfono para consultas o dudas: 976 76 95 69 (9:00 a 15:00)
- Email: farmaciapexternos@salud.aragon.es
- Horario: Lunes a Viernes: 9:00 – 15:00 h.
Martes y Jueves: 15:30 a 19:00h con cita previa