

LITFULO® RITLECITINIB



¿Qué dosis debo tomar?

Deberá tomar 1 comprimido de 50 mg 1 vez al día.

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

¿Cómo tomar LITFULO®?

La dosis recomendada de LITFULO® es de 50 mg por vía oral una vez al día:

- Traguen los comprimidos de LITFULO® **enteros con o sin alimentos**. No deben cortar, triturar ni masticar los comprimidos.
- Tomen LITFULO® con una comida aproximadamente **a la misma hora todos los días**.

¿Qué hago si olvido una dosis?

- Tomar esa dosis lo antes posible a menos que falten menos de 8 horas para la siguiente dosis.
- Si han pasado más de 8 horas, no tome la dosis olvidada. A partir de entonces, el tratamiento se debe reanudar a la hora programada habitual.
- En caso de vómito, NO tome otra dosis ese día, y continúe su tratamiento con normalidad.

¿Cuándo no debo tomar LITFULO®?

- Si es alérgico a ritlecitinib
- Infecciones graves activas
- Insuficiencia hepática grave
- Embarazo y lactancia.

Precauciones

- No se recomienda utilizar ritlecitinib en mujeres en edad fértil que no estén utilizando métodos anticonceptivos
- No tome LITFULO® si está embarazada o cree poder estarlo.

Interacciones

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación, productos naturales, multivitamínicos y/o plantas medicinales que tome.

Algunos de los medicamentos que producen interacciones con ritlecitinib son:

- Itraconazol, rifampicina, midazolam, quinidina, ciclosporina, ergotamina, tizanidina, teofilina, pirfenidona, sumatriptán

Revise con su médico y/o farmacéutico las posibles interacciones entre su tratamiento habitual y LITFULO®.

¿Qué efectos adversos puedo tener?

Las reacciones adversas más comunes son:

- Diarrea y molestias digestivas
- Acné, urticaria, erupción cutánea, foliculitis.
- Infecciones del tracto respiratorio superior.
- Mareo.

Avise rápidamente a su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave: enrojecimiento de la piel, dificultad para respirar...
- Fiebre o escalofríos, dificultad para respirar, cansancio inusual, ya que pueden ser signos de neumonía;
- Tiene una erupción cutánea dolorosa con ampollas con o sin fiebre, ya que esto puede ser un signo de herpes zóster.

Informe a su médico si alguna vez ha tenido infección por herpes zóster o tuberculosis o si recientemente ha estado en contacto con una persona con tuberculosis.

¿Cómo debo conservar LITFULO®?

- Mantenga la medicación en su envase original a temperatura ambiente, protegido de la luz.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.

CONTACTO

- Solicitud de citas: 876 76 42 39 (9:00 a 11:00)
- Teléfono para consultas o dudas: 976 76 95 69 (9:00 a 15:00)
- Email: farmaciapexternos@salud.aragon.es
- Horario: Lunes a Viernes: 9:00 – 15:00 h.
Martes y Jueves: 15:30 a 19:00h con cita previa